

UNIVERSIDAD DE CUENCA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

"Identificación y frecuencia de parásitos gastrointestinales en felinos silvestres en cautiverio en unidades de manejo de vida silvestre de la provincia del Azuay".

Tesis previa a la obtención del Título de Médico Veterinario Zootecnista.

Autores:

Paola Mariana Cañar Romero CI: 0105334312


Carlos Xavier Lojano Carmona CI: 0106858350

Director:

Dr. Gonzalo Estuardo López Crespo, Mg. Sc. Cl: 0300721636

Cuenca - Ecuador

2018



RESUMEN

El objetivo de esta investigación fue identificar y determinar la frecuencia de los parásitos gastrointestinales de felinos silvestres por especie, edad y sexo, mediante análisis coproparásitarios. Se trabajó con 44 felinos silvestres de tres unidades de manejo de vida silvestre de la provincia del Azuay; veinte y tres ejemplares de Panthera leo, seis de Puma concolor, once de Leopardus pardalis, dos de Leopardus wiedii y dos de Leopardus tigrinus. En el análisis estadístico, se determinó el porcentaje de parasitismo con tablas de contingencia y prueba de Chi cuadrado, para determinar diferencias con relación a la especie, sexo y edad. Los porcentajes obtenidos de la presencia de parásitos gastrointestinales fueron del 100% de los animales muestreados y se determinaron grados de parasitismo en una escala de leve, moderado, grave y muy grave. Posteriormente se realizó una relación entre las variables de edad, sexo y especie; por especie de parásito, frecuencia y grado parasitario. Los resultados mostraron que no hubo diferencia significativa (P>0,05) entre estas variables, sin embargo al relacionar el sexo y el Phylum Platelminto se evidenció una correlación significativa (P<0,05). conclusión todos los animales muestreados resultaron positivos a la presencia de parásitos gastrointestinales y se identificaron con mayor frecuencia Entamoeba histolytica, Toxocara leonina, Mesocestoides sp., Cystoisospora felis y Toxocara cati y en menor proporción Strongyloides sp., Ancylostoma Tubaeforme, Trichuris sp., Taenia sp., Spirometra mansonoides y Dipylidium caninum.

Palabras clave: Felinos silvestres, parásitos gastrointestinales, centros de manejo de vida silvestre, cautiverio, salud animal.


ABSTRACT

The purpose of this study was to identify and determine the frequency of the gastrointestinal parasites of the wild feline by species, age and sex, through coproparasilogical studies; 44 wild felines species from three wildlife institutions in Azuay province were part of this study; 23 Pathera leo species, 6 from Puma concolor, 11 from Leopardus pardalis, 2 from Leopardus wiedii and 2 from Leopardus tigrinus. In the statistical analysis, the percentage of parasitism was determined with contingency tables and Chi Cuadrado test to determine differences in relation to species, sex, and age. The percentages obtained from the presence of gastrointestinal parasites were 100% of the animals sampled and degrees of parasitism were determined on a scale of mild, moderate, severe, and very serious. Subsequently, a relationship was made between the variables of age, sex and species; by parasite species, frequency and parasitic degree. The result showed that there was no significant difference (P>0.05) between these variables; however, when relating the sex and the Phylum Platyhelminth a significant correlation was evidenced (P<0.05). In conclusion, all the sampled animals were positive for the presence of gastrointestinal parasites; Entamoeba histolytica, Toxocara leonina, Mesocestoides sp., Cystoisospora felis and Toxocara cati were more frequently identified and in a lesser proportion in Strongyloides sp., Ancylostoma tubaeforme, Trichuris sp.


Key words: Wild cats, gastrointestinal parasites, wildlife management centers, captivity, animal health.

INDICE


1.	INTRODUCCIÓN	18
2.	OBJETIVOS	19
2	2.2. Objetivo General	19
2	2.3. Objetivos Específicos	19
3.	HIPÓTESIS/PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN	19
4.	REVISIÓN DE LITERATURA	20
4	4.1 FELINOS	20
	4.1.1 Panthera leo	20
	4.1.2 Puma concolor	22
	4.1.2.1 Taxonomía	22
	4.1.2.2 Generalidades	22
	4.1.3 Leopardus pardalis	23
	4.1.3.1 Taxonomía	
	4.1.3.2 Generalidades	24
	4.1.4 Leopardus tigrinus	24
	4.1.4.1 Taxonomía	24
	4.1.4.2 Generalidades	25
	4.1.5 Leopardus wiedii	26
	4.1.5.1 Taxonomía	26
	4.1.5.2 Generalidades	26
4	4.2 HELMINTOS	27
	4.2.1 Parasitismo en felinos silvestres	27
	4.3 NEMATELMINTOS	28
	4.3.1 Strongyloides sp	28
	4.3.1.1 Ciclo evolutivo	29
	4.3.1.2 Signos y síntomas	29
	4.3.1.3 Diagnóstico	
	4.3.1.4 Prevención v control	



4.3.2 Ar	ncylostoma tubaeforme	30
4.3.2.1	Ciclo evolutivo	31
4.3.2.2	Signos y síntomas	31
4.3.2.3	Diagnóstico	32
4.3.2.4	Prevención y control	32
4.3.3 To	oxocara cati	32
4.3.3.1	Ciclo evolutivo	33
4.3.3.2	Signos y síntomas	33
4.3.3.3	Diagnóstico	34
4.3.3.4	Prevención y control	34
4.3.4 To	oxocara leonina	35
4.3.4.1	Ciclo evolutivo	35
4.3.4.2	Signos y síntomas	36
4.3.4.3	Prevención y control	36
4.3.5 <i>Tr</i>	richuris sp	36
4.3.5.1	Ciclo evolutivo	37
4.3.5.2	Signos y síntomas	37
4.3.5.3	Diagnóstico	38
4.3.5.4	Prevención y control	38
4.4 PLATI	ELMINTOS	39
4.4.1 <i>Di</i>	ipylidium caninum	39
4.4.1.1	Ciclo evolutivo	39
4.4.1.2	Signos y síntomas	39
4.4.1.3	Diagnóstico	40
4.4.1.4	Prevención y control	40
4.4.2 Sp	oirometra mansonoides	40
4.4.2.1	Ciclo evolutivo	41
4.4.2.2	Signos y síntomas	41
4.4.2.3	Diagnóstico	41
4.4.2.4	Prevención y control.	42
4.4.3 Ta	aenia sp	42



	4.4.3.1	Ciclo evolutivo	43
	4.4.3.2	Signos y síntomas	43
	4.4.3.3	Diagnóstico	43
	4.4.3.4	Prevención y control	43
	4.4.4 N	Mesocestoides sp	44
	4.4.4.1	Ciclo evolutivo	44
	4.4.4.2	Signos y síntomas	45
	4.4.4.3	Diagnóstico	45
	4.4.4.4	Prevención y control	45
4	4.5 PRO	TOZ00S	46
	4.5.1 C	Cystoisospora felis	46
	4.5.1.1	Ciclo evolutivo	46
	4.5.1.2	Signos y síntomas	47
		Diagnóstico	
	4.5.1.4	Prevención y control	47
	4.5.2 E	ntamoeba histolytica	48
	4.5.2.1	Ciclo evolutivo	48
	4.5.2.2	Signos y síntomas	49
	4.5.2.3	Diagnóstico	49
	4.5.2.4	Prevención y control	49
5.	MATERIA	ALES Y MÉTODOS	50
Ę	5.1 MATE	ERIALES Y EQUIPOS	50
	5.1.1 N	fateriales de campo	50
		Físicos	
	5.1.1.2	Biológicos	50
		fateriales de laboratorio	
		Físicos	
		Químicos	
	5.1.3 N	fateriales de oficina	51
	5.1.3.1	Físico	51
Ę	5.2 MÉT	DDOS	52



	5.2.1	Ubicación y división política	52
	5.2.2	Población en estudio	54
	5.2.2	.1 Población	54
	5.2.2	2 Muestra	54
	5.2.2	3 Muestreo	54
	5.2.2	.4 Criterios de inclusión	55
	5.2.2	5 Criterios de exclusión	55
	5.2.2	.6 Variables dependientes	56
	5.2.2	7 Variables independientes	56
5	.3 ME	TODOLOGÍA	57
	5.3.1	Examen clínico	57
	5.3.2	Métodos de Manejo	58
	5.3.3	Toma de muestra	59
	5.3.4	Pruebas de laboratorio	61
	5.3.4	.1 Método en fresco con Lugol	61
	5.3.4	2 Método de flotación con solución salina saturada	63
	5.3.4	.3 Método de sedimentación espontánea	66
	5.3.5	Interpretación	67
	5.3.6	Análisis estadístico	68
6.	RESUL	TADOS Y DISCUSIÓN	69
6	.1 RE	SULTADOS	69
	6.1.1	Prevalencia de parásitos gastrointestinales	69
	6.1.2	Grado de parasitismo gastrointestinal.	78
7.	DISCU	SION	82
8.	CONCL	USIONES	87
9.	RECON	MENDACIONES	88
10.	BIBLI	OGRAFÍA	89
11.	ANE	(OS	106

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Numero de felinos silvestres que participan en el estudio. 55
Tabla 2. Representación cuantitativa del nivel de parasitismo
Tabla 3. Frecuencia de parásitos gastrointestinales de 44 félidos silvestres 69
Tabla 4. Frecuencia de parásitos gastrointestinales de cinco especies félidos
silvestres en cetros de manejo de vida silvestre de la Provincia de Azuay 71
Tabla 5. Frecuencia de presencia de parásitos gastrointestinal por grupos etarios.
72
Tabla 6. Frecuencia de especies de parásitos por grupo etario
Tabla 7. Frecuencia de presencia de parásitos gastrointestinal por género 73
Tabla 8. Frecuencia de especies de parásitos por género de un total de 26
hembras y 18 machos74
Tabla 9. Frecuencia de presencia de parásitos gastrointestinales clasificado por
Phylum
Tabla 10. Presencia de parásitos gastrointestinales clasificado por Phylum y por
especie de felino silvestre
Tabla 11. Presencia de parásitos gastrointestinales clasificado por Phylum y por
género de felino silvestre
Tabla 12. Prueba de chi-cuadrado sexo con relación al phylum Platelminto 78
Tabla 13. Grado de parasitismo gastrointestinal mediante la técnica directa de
Lugol con relación a la presencia de parásitos en el total general de felinos
silvestres80
Tabla 14. Grado de parasitismo gastrointestinal mediante la técnica de Flotación
de solución salina con relación a la presencia de parásitos en el total general de
felinos silvestres80
Tabla 15. Grado de parasitismo gastrointestinal mediante la técnica de
Sedimentación con relación a la presencia de parásitos en el total general de
felinos silvestres 81

INDICE DE FIGURAS

Figura 1. Hembra, cría y macho de Panthera leo	21
Figura 2. Puma concolor	23
Figura 3. Leopardus pardalis	24
Figura 4. Leopardus tigrinus	25
Figura 5. Leopardus wiedii	27
Figura 6. Huevo de Strongyloides sp	28
Figura 7. Huevo de Ancylostoma tubaeforme	31
Figura 8. Huevo de Toxocara cati	33
Figura 9. Huevo de Toxocara leonina	35
Figura 10. Huevo de Trichuris sp	37
Figura 11. Huevo de Spirometra mansanoides	40
Figura 12. Huevo de Taenia sp	42
Figura 13. Huevo de Mesocestoides sp	44
Figura 14. Huevo de Cystoisospora felis	46
Figura 15. Huevo de Entamoeba histolytica	48
Figura 16. Mapa de la provincia del Azuay	52
Figura 17. Evaluación Visual	57
Figura 18. Evaluación Física	58
Figura 19. Distractivos para aislamiento	58
Figura 20. Limpieza de cubiles de manejo	59
Figura 21. Aislamiento de Panthera leo en cubiles de manejo	59
Figura 22. Toma de muestras	60
Figura 23. Recepción de muestras.	61

INDICE DE ANEXOS

Anexo 1. Grado de parasitismo gastrointestinal con relación a la especie de felino
en la prueba coproparasitaria de Lugol106
Anexo 2. Grado de parasitismo gastrointestinal con relación a al genero en la
prueba coproparasitaria de Lugol
Anexo 3. Grado de parasitismo gastrointestinal con relación grupo etario en la
prueba coproparasitaria de Lugol107
Anexo 4. Grado de parasitismo gastrointestinal con relación al género mediante
prueba coproparasitaria de Flotación107
Anexo 5. Pruebas de chi-cuadrado en comparación de cada especie con el
phylum Platelmintos
Anexo 6. Pruebas de chi-cuadrado en comparación de cada especie con el
phylum Nematodos
Anexo 7. Pruebas de chi-cuadrado en comparación de cada especie felina
silvestre con el phylum Protozoos
Anexo 8. Pruebas de chi-cuadrado del sexo con relación al phylum Protozoo 109
Anexo 9. Pruebas de chi-cuadrado del sexo con relación al phylum Nematodo.110
Anexo 10. Pruebas de chi-cuadrado sexo con relación al phylum Platelminto 110
Anexo 11. Pruebas de chi-cuadrado de la edad con relación al phylum Nematodos
111
Anexo 12. Pruebas de chi-cuadrado de la Edad con relación al phylum
Platelmintos111
Anexo 13. Pruebas de chi-cuadrado de la Edad con relación al phylum Protozoos
Anava 14 Hoja da campo



Cláusula de licencia y autorización para publicación en el Repositorio Institucional

Paola Mariana Cañar Romero en calidad de autor/a y titular de los derechos morales y patrimoniales del trabajo de titulación "Identificación y frecuencia de parásitos gastrointestinales en felinos silvestres en cautiverio en unidades de manejo de vida silvestre de la provincia del Azuay", de conformidad con el Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN reconozco a favor de la Universidad de Cuenca una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra, con fines estrictamente académicos.

Asimismo, autorizo a la Universidad de Cuenca para que realice la publicación de este trabajo de titulación en el repositorio institucional, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

Cuenca, 06 Febrero de 2018.

Paola Mariana Cañar Romero

C.I: 010533431-2



Cláusula de licencia y autorización para publicación en el Repositorio Institucional


Carlos Xavier Lojano Carmona en calidad de autor/a y titular de los derechos morales y patrimoniales del trabajo de titulación "Identificación y frecuencia de parásitos gastrointestinales en felinos silvestres en cautiverio en unidades de manejo de vida silvestre de la provincia del Azuay", de conformidad con el Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN reconozco a favor de la Universidad de Cuenca una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra, con fines estrictamente académicos.

Asimismo, autorizo a la Universidad de Cuenca para que realice la publicación de este trabajo de titulación en el repositorio institucional, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

Cuenca, 06 Febrero de 2018.

Carlos Xavier Lojano Carmona

C.I: 010685835-0





Universidad de Cuenca Cláusula de Propiedad Intelectual

Paola Mariana Cañar Romero, autor/a del trabajo de titulación "Identificación y frecuencia de parásitos gastrointestinales en felinos silvestres en cautiverio en unidades de manejo de vida silvestre de la provincia del Azuay", certifico que todas las ideas, opiniones y contenidos expuestos en la presente investigación son de exclusiva responsabilidad de su autor/a.

Cuenca, 06 de Febrero de 2018

Paola Mariana Cañar Romero

C.I: 010533431-2






Universidad de Cuenca Cláusula de Propiedad Intelectual

Carlos Xavier Lojano Carmona, autor/a del trabajo de titulación "Identificación y frecuencia de parásitos gastrointestinales en felinos silvestres en cautiverio en unidades de manejo de vida silvestre de la provincia del Azuay", certifico que todas las ideas, opiniones y contenidos expuestos en la presente investigación son de exclusiva responsabilidad de su autor/a.

Cuenca, 06 de Febrero de 2018

Carlos Xavier Lojano Carmona

C.I: 010685835-0



AGRADECIMIENTO

Queremos agradecer, a Dios y a nuestras familias por toda la paciencia y apoyo que nos han brindado a lo largo de toda nuestra carrera universitaria.

A nuestros profesores, los cuales a lo largo de nuestra vida académica supieron formarnos como profesionales y como personas. En especial queremos agradecer al Dr. Gonzalo López M.V.Z, al Dr. Luis Ayala M.V.Z., Msc, PhD, al Dr. Guillermo Guevara PhD, al Dr. Raúl Guevara PhD y al Dr. Fredi Carpio M.V.Z Msc, por el apoyo incondicional y sobre todo por alentarnos a realizar un tema innovador y no dejarnos llevar por las dudas y miedos que teníamos al inicio de toda nuestra travesía.

De igual manera queremos agradecer al Dis. José Cajamarca por todo el apoyo en cuanto al arte gráfico y videos realizados en esta tesis.

Y por último queremos agradecer al Ing. Rafael Ochoa (Ministerio del Ambiente) al Biól. Ernesto Arbeláez (Amaru), al Sr. Alberto Vele (Yurak Allpa) y al Ing. Giordano Torres (Corasari) directivos de los centros de rescate de vida silvestre del Azuay y a todo su equipo de zoo cuidadores, ellos fueron el pilar más importante para nuestra investigación.

DEDICATORIA

Quiero dedicar este trabajo a Dios por ser la luz que guía mi camino y por tantas bendiciones que ha regado en mi familia, a mis padres Bertha y Saúl y a mis hermanos Jonathan y Andrés por todo el apoyo y paciencia que me han dado a lo largo de estos años de universidad, gracias padres y hermanos por siempre llevarme por el camino de la humildad, independencia y promoverme que el estudio es un pilar importante para ayudar a los que más lo necesitan, con el tiempo espero llegar a ser una persona tan grandiosa como ustedes.

Este trabajo también va dedicado a mi gran amigo y compañero de tesis Xavier, quiero agradecerte por todo el apoyo y trabajo que dedicaste, gracias por entender que esta lucha es de todos sin importar la afinidad que tengas hacia otra rama de la Medicina Veterinaria, sé que fue difícil pero lo aprendido nadie nos quita.

Y, por último, pero no menos importante quiero dedicar este trabajo investigativo a todos aquellos que no tienen voz y la oportunidad de ser libres, a todos los animales que sufrieron la destrucción del ser humano y terminaron cautivos. Ustedes son mi mayor inspiración y el aliento para seguir en la lucha de defender sus derechos, a ustedes les dedico mi vida y mi trabajo en recompensa por sufrir la ignorancia de otro ser humano.

Paola.

DEDICATORIA

Al empezar hacer nuestra tesis de grado lo primero que pensamos fue en todo lo negativo, en todos los obstáculos que íbamos a tener al trabajar en un campo nuevo para la Medicina Veterinaria y Zootecnia en nuestra región, obstáculos que fueron superados a lo largo del tiempo con ayuda de excelentes profesores universitarios que con su tutela pudimos salir adelante en este objetivo.

Dedico el siguiente trabajo primeramente a Dios, que ha sido quien me ha bendecido toda mi vida con personas magnificas, como mis padres Manuel y Estela que han sido un pilar fundamental en mi educación desde mi nacimiento, en especial a mi Madre quien es la persona que ha estado siempre ahí en las buenas y las malas, dándome consejos, regaños, pero sobre todo cariño para lograr convertirme en una persona de calidad. A mis hermanos Iván y Franklin que de una u otra manera han sabido poner su granito de arena para apoyarme y darme ánimos, sin dejar a lado a Ricky el pequeño consentido, espero ser un gran ejemplo para ti.

A Paola, una de las mejores amistades que he conseguido en esta etapa de mi vida y plasmada en este proyecto como compañera de tesis y mentora, gracias por tanta paciencia y perseverancia para lograr nuestro objetivo.

También dedico esta investigación a personas que marcan nuestras vidas y dejan muy buenos recuerdos y enseñanzas como Salome, compañeros de la facultad, amigos y demás familiares.

Xavier

1. INTRODUCCIÓN

En el Ecuador la fauna silvestre es abundante y variada, lamentablemente todos estos animales se han visto amenazados por la deforestación, destrucción del hábitat, tráfico de animales, tráfico de pieles, varias de estas especies han terminado en zoológicos, centros de rehabilitación o centros de rescate obligados lamentablemente al cautiverio en la mayoría de casos (Arrojo, 2002).

El tráfico de animales en es una actividad ilícita muy lucrativa; en el Ecuador el problema es grave y esto hace que muchas especies amenazadas lleguen a desaparecer. Las personas que adquieren animales silvestres desconocen que para capturar la cría de una especie, los cazadores matan a sus madres, y cuando se logra rescatar o decomisar estos animales de traficantes, el 75% termina muerto, lesionado de por vida o en condiciones no aptas para volver a ser liberados a la naturaleza (Zooquito, 2018).

Con el fin de tener mejor manejo se han implementado diferentes estudios para preservar la salud de estos animales, entre estos estudios los de mayor relevancia son aquellos que hablan sobre enfermedades parasitarias (Ruiz, Pergazere, & Kuhn, 2011).

En condiciones naturales varios organismos pueden mantener interacciones benéficas unos con otros, pero en otras interacciones los resultados pueden ser perjudiciales como el caso del parasitismo (Silva, 2010). La parasitosis gastrointestinal es un tema de gran importancia en todos los animales tanto domésticos como silvestres por las consecuencias que sufren sus hospederos. Las parasitosis pueden ser asintomáticas, otras pueden causar, anorexia, pérdida de peso, diarrea, vómito, depresión y en casos graves hasta la muerte (Arrojo, 2002).

2. OBJETIVOS

2.2. Objetivo General


 Identificar los parásitos gastrointestinales de felinos silvestres criados en unidades de manejo de vida silvestre de la provincia del Azuay.

2.3. Objetivos Específicos

- Determinar la frecuencia de parasitismo gastrointestinal existente en felinos silvestres en cautiverio de la provincia del Azuay.
- Evaluar el grado de parasitosis gastrointestinal mediante tres técnicas de laboratorio.

3. HIPÓTESIS/PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

La especie y sexo de los felinos silvestres de la provincia del Azuay influyen sobre la frecuencia y tipo de parásitos gastrointestinales.



4. REVISIÓN DE LITERATURA

4.1 FELINOS

Los felinos son mamíferos que requieren carne para sobrevivir (Publishing, 2017), en ésta familia existen alrededor de cinco a doce géneros de felinos, que comprenden 37 especies las cuales se encuentran distribuidas en casi todo el mundo (Silva, 2010). Estos animales son carnívoros y tienen características anatómicas especiales como, oídos muy desarrollados, uñas afiladas y retractiles, ojos nictálopes que les permite cazar en la oscuridad, además están provistos de sentidos muy agudos, si miden las hembras son más pequeñas que los machos (Paradais Sphynx, 2014).

4.1.1 Panthera leo

4.1.1.1 Taxonomía

Dominio: Eucarya,

• Reino: Animalia,

Subreino: Eumetazoa,

• Filo: Chordata.

Subfilo: Vertebrata,

• Clase: Mammalia,

• Subclase: Theria.

Infraclase: Placentalia

Orden: Carnívora,

• Suborden: Feliformia,

• Familia: Felidae

Subfamilia: Pantherinae

Género: Panthera


• Especie: Panthera leo (Linnaeus, 1771)

4.1.1.2 Generalidades

Su nombre común es león africano, son los únicos felinos que viven en grupos o manadas que pueden estar conformadas por una docena de hembras y tres machos, los leones machos lucen una melena que rodea su cabeza, mientras que las hembras tienen su cabeza descubierta y son las encargadas de cazar y proveer alimento para la manada (Geographic, 2010). El león es un mamífero carnívoro que tiene un promedio de vida de 10 a 14 años, su periodo de gestación es de 110 días. Este animal se ve amenazado por la destrucción de su hábitat y la caza furtiva (Paradais Sphynoc, 2014).



Figura 1 Hembra, cría y macho de Panthera leo Fuente: (Pareja, 2013)



4.1.2 Puma concolor

4.1.2.1 Taxonomía

• Dominio: Eucarya

• Reino: Animalia

• Subreino: Eumetazoa

• Filo: Chordata,

• Subfilo: Vertebrata

• Clase: Mammalia

• Subclase: Theria,

• Infraclase: Placentalia

• Orden: Carnívora

• Suborden: Feliformia

• Familia: Felidae

• Subfamilia: Felinae

Género: Puma

• Especie: *Puma concolor* (Naturalista, 2007)

4.1.2.2 Generalidades

Puma o león de montaña es un depredador increíble, sus presas son alces, venados, caballos, vacas y ovejas, aunque también se puede alimentar de roedores e insectos. (Botero, Sánchez, & Arias, 2012). Su color de piel puede ir de bayo al rojizo, su tamaño es variable los machos pesan de 50 a 65 kg y las hembras de 35 a 45 kg, su longitud incluyendo la cola puede ser en machos de 2.20 metros y en hembras de 2 metros (Thüngen, 1987).



Figura 2 Puma concolor Fuente: (Zoológico Amaru, 2015)

4.1.3 Leopardus pardalis

4.1.3.1 Taxonomía

• Dominio: Eucarya

• Reino: Animalia

• Subreino: Eumetazoa

• Filo: Chordata

Subfilo: Vertebrata

• Clase: Mammalia

Subclase: Theria

Infraclase: Placentalia

• Orden: Carnívora


Suborden: Feliformia

• Familia: Felidae

Subfamilia: Felinae

Género: Leopardus

• Especie: Leopardus pardalis (Clavijo & Ramirez, 2007)



4.1.3.2 Generalidades

Esta especie se distribuye a lo largo de Norte América, Centro América y Sur América, debido a su pelaje fue cazado furtivamente y puesto en peligro a mediados del siglo pasado (Clavijo & Ramirez, 2007). Su nombre común es ocelote o tigrillo (Linnaeus, Metropol, 1758) y es reconocido por su cuerpo esbelto, sus ojos pequeños y orejas redondas, su peso va desde los 8 a 18 kg y mide de 68 a 100 cm de longitud, su dimorfismo sexual está presente ya que los machos son de mayor tamaño que las hembras, su alimentación es de aves, pequeños mamíferos, reptiles, peces, moluscos y crustáceos. Su tiempo de gestación es de 70 a 85 días (Feline Worlds, 2014).



Figura 3 Leopardus pardalis Fuente: (Zoológico Amaru, 2015)

4.1.4 Leopardus tigrinus

4.1.4.1 Taxonomía

• Dominio: Eucarya

• Reino: Animalia

• Subreino: Eumetazoa

• Filo: Chordata

Subfilo: Vertebrata

Clase: Mammalia

Subclase: Theria

Infraclase: Placentalia

Orden: Carnívora

• Suborden: Feliformia

• Familia: Felidae

Subfamilia: FelinaeGénero: Leopardus


• Especie: *Leopardus tigrinus* (Schreber, 1775)

4.1.4.2 Generalidades

Se les conoce como tigrillos u oncillas (Schreber, 1775) son felinos que se encuentran en América del Sur, su hábitat es exclusivamente forestal, su tamaño promedio va de 38 a 56 cm, su peso va de 1.5 a 3 kg. Los machos son más grandes que las hembras (Botero, Sánchez, & Arias, 2012), es nocturno, su alimentación se basa en roedores, comadrejas, lagartijas, pájaros, huevos y anfibios, su periodo de vida oscila entre los 11 años en libertad y 17 años en cautiverio y su gestación dura entre los 74 a 76 días (Soria, 2014).



Figura 4 Leopardus tigrinus Fuente: (Zoológico Amaru, 2017)



4.1.5 Leopardus wiedii

4.1.5.1 Taxonomía

• Dominio: Eucarya

• Reino: Animalia

Subreino: Eumetazoa

• Filo: Chordata

Subfilo: Vertebrata

• Clase: Mammalia

• Subclase: Theria

Infraclase: Placentalia

Orden: Carnívora

Suborden: Feliformia

• Familia: Felidae

Subfamilia: Felinae

Género: Leopardus

• Especie: Leopardus wiedii (Aranda, 1998)

4.1.5.2 Generalidades

Es un felino de tamaño intermedio pesa alrededor de 3kg, sus ojos son extraordinariamente grandes resaltando su hábito nocturno, su color varia de amarillo pardo a marrón grisáceo (Romero, 2009), su longevidad es de 20 años de en vida libre y 24 años en cautiverio, su alimentación es de mamíferos pequeños o medianos, su tamaño es de 56 cm y las hembras tienen un tamaño similar al de los machos (Aranda, 1998), se le conoce también como "Margay", "Tigrillo", "Gato montés", "Maracayá" y "Gato de Wied" (EcuRed, 2015).




Figura 5 Leopardus wiedii Fuente: (Zoológico Amaru, 2015)

4.2 HELMINTOS

4.2.1 Parasitismo en felinos silvestres

Las parasitosis gastrointestinales son de impacto negativo en la salud de los animales silvestres, los daños que pueden existir van desde afecciones leves, daños graves e incluso la muerte. Todo esto depende de la localización de los parásitos, el grado de infestación y las condiciones de vida (Arrojo, 2002). Estudios realizados en varios países han podido demostrar que los felinos silvestres son hospedadores de varios endoparásitos, en los cuales se incluyen nemátodos, platelmintos y protozoos algunos de carácter zoonótico (Silva, 2010). La parasitosis son seres vivos que viven en otros seres vivos, en donde se alimentan y viven. Se adquieren en alimentos, agua contaminada y vectores (Plus, 2016). Los helmintos no tienen un ancestro común ya que presentan cuatro phylum que no guardan relación unos con otros, estos son: Platyhelminthes (gusanos planos), Acantocephala (cabeza espinosa), Nemátoda (Gusanos redondos), Annelida (gusanos segmentados) (Guillen, Vidal, Aguirre, & Rodriguez, 2012).



4.3 NEMATELMINTOS

Este es uno de los *Phylum* más abundante en la naturaleza algunos son de vida libre y otros son organismos parásitos de plantas y animales vertebrados. Son gusanos de cuerpo cilíndrico (Barros, 2013). Los nemátodos pueden medir desde pocos milímetros hasta más de un metro, carecen de estructuras para engancharse al hospedador pero se mantienen dentro de ellos por medio de un mecanismo de contracción, realizan ciclos directos e indirectos, en su ciclo de vida se incluye la forma de huevos y cuatro estadios larvales. (Montoya & Restrepo, 2010).

4.3.1 Strongyloides sp.

Los *Strongyloides* son parásitos que tienen la capacidad de procrear generaciones de vermes los cuales pueden tener vida libre o convertirse en parásitos (Ramón, 2012). Se aloja en el intestino delgado en su estado adulto, mientras que, en la sangre, piel, pulmones y otros órganos se pueden encontrar estadios inmaduros transitorios. (Junquera, 2015) La morfología de estos parásitos es fina y en su extremo posterior es agudo, miden entre 500-600 micras en su fase de larva, mientras que el tamaño de los huevos va de 25-50 micras, estos huevos se encuentran en la submucosa del intestino delgado (Uribarren, 2015).



Figura 6 Huevo de *Strongyloides sp.* **Fuente:** (Autores, 2017)


4.3.1.1 Ciclo evolutivo

Las larvas rabditoides de Strongyloides al ser eliminadas por heces sufren dos transformaciones para convertirse en larvas filariformes infectivas, que ingresan a través de la piel, luego por vía sanguínea llegan a pulmones donde mudan a larvas de estadio L4, las cuales van por la tráquea, laringe y faringe, aquí son deglutidas alcanzando el intestino delgado donde se transforma en hembra adulta y pone los huevos que eclosionan dando lugar a larvas filariformes (Estrella, 2015). Las larvas rabditoides nuevamente son desechadas en las excretas fecales. Si estas larvas caen en un suelo que tenga las condiciones adecuadas en cuanto a humedad y sombra puede darse el desarrollo de las larvas en parásitos adultos (Uribarren, 2015).

Existen un ciclo de vida denominado autoinfección en el que las larvas rhabditoides se transforman en larva filariforme en el intestino o márgenes del ano, penetrando la mucosa y repite el ciclo en el mismo hospedador, llegando a pulmones y posteriormente llega al aparato digestivo (Martinez, González, & et al, 2011)

4.3.1.2 Signos y síntomas.

En la mayoría de los casos el animal infectado no presenta síntomas clínicos visibles para los médicos, a menos que exista una alta carga parasitaria provocando diarrea (Barros, 2013). Las diarreas causadas por Strongyloides sp. puede ser ligera y pasar desapercibida, pero en animales inmunocomprometidos esta infección puede llegar a ser insidiosa e incluso fatal (Miró & et al, 1995). En algunos casos, se pueden observar inflamación de la piel, erupciones cutáneas, dermatitis, tos, bronconeumonía, diarrea o estreñimiento y muchas veces la presencia de sangre o moco en las excretas fecales. Cuando se da una infección masiva pulmonar por migración larvaria se pueden observar peteguias y hemorragias (Estrella, 2015).



4.3.1.3 Diagnóstico

Para determinar el parásito se realiza la visualización directa mediante exámenes coprológicos seriados para buscar huevos y larvas rhabditoides de *Strongyloides sp.* (Martinez, González, & et al, 2011). La visualización se dificulta ya que depende del número de parásitos presentes (UCE, 2015).

4.3.1.4 Prevención y control

Los principales aspectos que previenen la infección por Strongyloides sp., es evitar el hacinamiento en criaderos, jaulas, tiendas de mascotas, y todo lo que implique el manejo de instalaciones (Barros, 2013). Un punto clave en la prevención radica en realizar rutinariamente exámenes coprológicos de los animales para determinar su estado sanitario, (Ramón, 2012). Otro punto clave es el tratamiento de las madres en la etapa de gestación previniendo así la contaminación de las crías (Barros, 2013).

4.3.2 Ancylostoma tubaeforme.

Los parásitos miden alrededor de 8 a 20 mm de largo, los machos son más cortos que las hembras, además de que las hembras terminan su cuerpo en punta y los machos poseen unos lóbulos que sirven para su reproducción (Databio, 2014) Los anquilostomas de *Ancylostoma tubaeforme* es la especie que afecta a felinos en edades tempranas. Este parásito consta de cabezas con ganchos que les sirve para adherirse a la pared del intestino delgado y se comienzan alimentar de tejido y succionar sangre (Youssefi, Hoseini, Zaheri, & Abouhosseini, 2010).



Figura 7 Huevo de *Ancylostoma tubaeforme*. **Fuente**: (Autores, 2017)

4.3.2.1 Ciclo evolutivo

Las formas adultas del parásito viven en el intestino principalmente se alimenta de sangre (ESCCAP, 2013), los huevos son excretados en las heces, estos huevos no son infectivos inmediatamente, necesitan incubar y pasar por dos mudas hasta llegar al estado de larva infectante (Ramón, 2012). En condiciones adecuadas para el parásito las larvas alcanzan el desarrollo en 4 a 7 días. En el hospedador estas larvas entran a través de la dermis y viajan por los vasos linfáticos y venas para llegar a pulmones, pasan por los alveolos hasta llegar a la tráquea y aquí son ingeridos nuevamente hasta llegar al intestino para su maduración a los 18 meses, en el sitio de implantación pueden dejar ulceras (Iowa State University, 2005).

4.3.2.2 Signos y síntomas.

Los animales infestados por *Ancylostoma tubaeforme* presentan anemia y perdida de la condición corporal, en algunos casos se ha observado desde diarrea simple hasta diarrea sanguinolenta, estos signos se presentan de forma aguda o crónica (ESCCAP, 2013) Los signos van a depender del número de parásitos con que el animal se encuentre, según estudios en gatos infectados experimentalmente con 1000 a 2000 larvas se observó pérdida de peso en comparación con los que recibieron de 100 a 500 larvas, incluso los animales que recibieron la mayor dosis murieron al cabo de 12 a 47 días. También se observó una caída de los niveles de hemoglobina (Bowman, Barr, Hendrix, & Lindsay, 2003).



Al realizar su migración a través de la piel ocasionan una dermatitis local con

4.3.2.3 Diagnóstico

posibles erupciones (Escobedo, 2015)

El diagnóstico de la anquilostomiasis se realiza por exámenes coprológicos y por identificación de huevos, es recomendable tomar en cuenta también el hematocrito, con los signos clínicos y la condición corporal del animal (Alfaro, 2011) Muchas veces los huevos no son excretados por lo que es necesario repetir el muestreo para detectar la infección. Otra opción son ELISA y mediante cultivo de las heces fecales (Iowa State University, 2005).

4.3.2.4 Prevención y control

Un método de control es la desinfección del suelo o superficies inanimadas, la larva es eliminada con borato sódico, etanol al 70% por 10 minutos, una solución de Yodo de 50 o 60 ppm usándolo entre 15 a 30°C. Por otro lado, se pueden limpiar las zonas donde habiten animales con agua caliente sobre los 80°C. En lo que refiere al control mediante fármacos antiparasitarios, los más usados son el Albendazol, Mebendazol, Nitazoxanida y el Embonato de Pirantel (Databio, 2014). En áreas endémicas donde se han reportado casos de infección por *Ancylostoma sp.* se recomienda la desparasitación continua de animales especialmente los perros (Cazares, Juárez, & Mejía, 2014).

4.3.3 Toxocara cati

Es un parásito de forma cilíndrica, segmentada al llegar a la adultez es de color rosa, los machos miden de 4 a 6 cm, mientras que las hembras alcanzan de 6 a 10 cm (Databio, 2016).

Por lo general el tratamiento antihelmíntico se puede realizar una vez al mes ya que el periodo de prepatencia de la toxocara es alrededor de cuatro semanas (European Scientific Counsel Companion Animales Parasites, 2006).



Figura 8 Huevo de *Toxocara cati.* Fuente: (Autores, 2017)

4.3.3.1 Ciclo evolutivo

Los gusanos adultos se encuentran en el intestino delgado y producen huevos que se excretan en las heces, al principio este huevo no es embrionado, este pasa a desarrollarse después de 15 a 19 días siempre y cuando exista un ambiente óptimo de temperatura y humedad en el medio ambiente suceden dos mudas hasta lograr que la larva llegue al tercer estadio (Iowa State University, 2005). El hospedador se infecta por consumo de los huevos o roedores infectados. Por lo general las larvas que siguen el recorrido de migración hígado-pulmones regresan nuevamente a estómago a través de la tráquea y su posterior ingestión (Bowman, Barr, Hendrix, & Lindsay, 2003).

4.3.3.2 Signos y síntomas.

Los cachorros de felinos se pueden infectar de su madre solo a través de la leche materna (Iowa State University, 2005). En la mayoría de casos los hospedadores desarrollan una forma subclínica, mientras que en casos con alta carga parasitaria aparecen signos clínicos muy evidentes de la infección, el felino puede mostrar el

abdomen abultado, el médico en ocasiones podría palpar las asas intestinales engrosadas, obstrucciones, vómito, anorexia y mal estado en general de la condición corporal (ESCCAP, 2013).

En una investigación un gato infestado de *Toxocara cati* revelo una ulcera gástrica y una perforación en la pared intestinal, aunque es difícil determinar si estos parásitos fueron responsables de estas lesiones (AAVP, 2014).

4.3.3.3 Diagnóstico

El diagnóstico se basa en varias pruebas de laboratorio como la visualización directa a través de exámenes coprológicos, si el análisis es negativo no se descarta la posibilidad de que el paciente está pasando por el periodo de prepatencia, por lo que se recomienda repetir la prueba (Ramón, 2012). El diagnóstico de larva migrans visceral se basa en el test de ELISA. En los casos de larva migrans ocular se realizan diagnósticos oftalmológicos, Incluso se podrían realizar pruebas imagenólogicas, las cuales permiten identificar lesiones ovales localizadas en el hígado (Uribarren, 2015).

4.3.3.4 Prevención y control

Un control general de la transmisión de *Toxocara cati* se basa en que los animales deben ser tratados con un plan de desparasitación, lo que impide la excreción de huevos y su posterior transmisión a animales sanos. La limpieza de las instalaciones ayuda a reducir significativamente los casos positivos. En lo posible de debe restringir el acceso de perros y gatos callejeros a instalaciones donde permanezcan animales susceptibles (Iowa State University, 2005). La desinfección de las zonas de permanencia de animales se puede utilizar etanol al 70%, yodo en distintas concentraciones e hipoclorito sódico al 2% (Databio, 2014).

4.3.4 Toxocara leonina


Toxocara leonina es un áscari que se encuentra en todo el mundo los cuales se pueden localizar en el intestino delgado de cánidos y en félidos, domésticos y de vida silvestre. La transmisión ocurre cuando el huésped definitivo se come el roedor infectado con este parásito. (Sheng, y otros, 2012). Este parásito tiene preferencia por los climas fríos, en estado adulto *Toxocara leonina* alcanza el tamaño de 10 cm de largo (Rus, 2014).



Figura 9 Huevo de *Toxocara leonina*.
Fuente: (Autores, 2017)

4.3.4.1 Ciclo evolutivo

Toxocara leonina tiene un periodo de prepatencia de 8 a 11 semanas, habita en el intestino delgado, excreta huevos no embrionados a través de las heces y tiene ciclo biológico corto, necesita una semana para llegar a su fase adulta infectante mientras que otras especies de *Toxocara* necesitan de cuatro semanas (Ramón, 2012). Para poder completar el ciclo biológico este parásito necesita un hospedador intermediario como un roedor, los huevos eclosionan en su tracto digestivo y viaja a la mucosa intestinal, donde pasa por mudas hasta llegar nuevamente a la luz del intestino a terminar su desarrollo. Estas larvas llegan a los tejidos y forman quistes musculares haciendo que los hospedadores finales se contagien cuando ingieren el roedor infectado (Rus, 2014).



4.3.4.2 Signos y síntomas.

La infección muchas de las veces no se ve reflejada en síntomas clínicos por lo que se recomienda exámenes coprológicos rutinarios para su diagnóstico (ESCCAP, 2013). Los felinos con alta carga parasitaria muestran síntomas como apatía, inapetencia, pelo hirsuto, vómitos, debilidad y pérdida de peso. Muchas veces las crías pueden presentar el abdomen abultado. El vómito y las heces pueden contener larvas de parásitos (Junquera, 2015). En adultos los síntomas son enteritis leve y obstrucciones a nivel intestinal (Ramón, 2012).

4.3.4.3 Prevención y control

Las madres en periodo gestación y lactancia deben ser desparasitadas, con el fin de neutralizar la transmisión a las crías. Se ha demostrado que el uso de febendazole elimina el 99% de larvas de *Toxocara leonina*. (Ramón, 2012). Para el control de estos parásitos se deben hacer limpiezas de instalaciones mediante desinfectantes como el etanol al 70%, distintas concentraciones de yodo, también mediante inactivación física por temperaturas inferiores a 15° C, desecación y luz solar directa (Databio, 2016)

4.3.5 Trichuris sp.

Esta especie de parásito está localizada en la región del ciego y colon de gatos. El macho mide 21,5 mm de largo, mientras que la hembra puede alcanzar de 17 a 35 mm de longitud (Quiroz, 1999). Presenta morfología de látigo, este parásito está libre y se moviliza en el lumen intestinal, su extremo anterior filariforme le permite adherirse a la mucosa intestinal, causando enteritis hemorrágica (Ramón, 2012).



Figura 10 Huevo de *Trichuris sp.* Fuente: (Autores, 2017)

4.3.5.1 Ciclo evolutivo

El ciclo de vida de *Trichuris sp.* es directo por lo que madura en un solo huésped, los huevos en el medio ambiente pueden sobrevivir por varios años, la infección es causada por ingestión de los huevos embrionados, los cuales mudan y eclosionan en el tercer estado larvario para luego entrar en la mucosa del intestino delgado, durante siete a diez días para desarrollarse, estos parásitos regresan a la luz intestinal y viajan hasta el ciego donde establecen su estado adulto (lowa State University, 2005). El periodo prepatente dura pocas semanas (Jubb, 1985).

4.3.5.2 Signos y síntomas.


Los animales adultos no presentan inmunidad ante la infestación de *Trichuris sp.* por lo que están propensos a sufrirla nuevamente (Ramón, 2012). La mayoría de los casos son asintomáticos, pueden desarrollar diarrea mucoide a hemorrágica, perdida de condición corporal, anemia (Iowa State University, 2005). Si la infección es severa, los signos clínicos pueden ir acompañados de eosinofilia y niveles de hipoproteinemia, raramente se presenta anormalidades del equilibrio de electrolitos séricos como hiponatremia e hipercalemia (Washabau & Day, 2012).

4.3.5.3 Diagnóstico

Para llegar al diagnóstico de la enfermedad se debe tomar en cuentas los aspectos clínicos y de laboratorio, ya que en infestaciones leves y moderadas es complicado dar un diagnóstico basándose solamente en los signos clínicos (Carrada, 2004) Se debe realizar un examen de heces de los animales sospechosos, mediante el método de flotación e identificar huevos de *Trichuris sp.*, en caso de no encontrar los huevos realizar de una a dos pruebas confirmatorias (Ramón, 2012). Muchas veces la sangre que se encuentra en las heces es un indicativo de la infección por *Trichuris sp.* aunque no es un signo patognomónico (World heritage Encyclopedia, 2002).

4.3.5.4 Prevención y control

Se debe limpiar regularmente los hábitats de los animales y restringir el acceso de animales callejeros que maximizan el riesgo de transmisión (Ramón, 2012). En lo posible se recomienda que el piso de las instalaciones sea de concreto, para facilitar la desinfección mediante el uso de desinfectantes como el hipoclorito de sodio e incluso usar en lanzallamas (ESCCAP, 2013). En lo posible se debe eliminar zonas húmedas para controlar la contaminación ya que los huevos de *Trichuris* sp. alcanzan a sobrevivir por largos periodos de tiempo en zonas húmedas y con sombra (Iowa State University, 2005). Para el control de parásitos se requiere seguir un plan de desparasitación con antihelmínticos adecuados y específicos (ESCCAP, 2013).



4.4PLATELMINTOS.

Los platelmintos viven en agua salada o dulce y en hábitats húmedos, son conocidos como gusanos planos (Gil Recio, 2016),

4.4.1 Dipylidium caninum

El *Dipylidium caninum* es un céstodo de distribución mundial encontrado frecuentemente en el perro o gato doméstico, es una enfermedad zoonótica (Gallego, 2006). Morfológicamente puede alcanzar 50 cm de longitud por 2 o 3 mm de ancho, su escólex tiene cuatro ganchos para adherirse a la mucosa intestinal (Ayala, Domenech, Rodriguez, & Urquiaga, 2012).

4.4.1.1 Ciclo evolutivo

Los huéspedes definitivos se contaminan cuando los perros o gatos ingieren pulgas o piojos infestados, los parásitos adultos maduran a las cuatro semanas, los proglótidos grávidos migran hacia el ano y son eliminados en las heces (Uribarren, 2016). Ctenocephalides canis, C. felis, Pulex irritans y Thichodectos canis son hospedadores intermediarios, estos se infestan cuando ingieren heces de perros con estadios larvarios del parásito (Quiroz, 1999).

4.4.1.2 Signos y síntomas

La infección es asintomática en la mayoría de casos solo cuando el número de tenias adultas es elevado produce daño a los hospedadores (Chávez, 2015). Los signos clínicos no suelen ser específicos a menudo en mascotas o en humanos se presentan de forma clínica con diarrea o estreñimiento, anorexia, pérdida de peso, dolor epigástrico, inquietud y picazón en la zona anal (Junquera, 2012).

4.4.1.3 Diagnóstico

Se lleva a cabo cuando se identifican los proglotis en la región perianal, heces o en el suelo (Andrango & Morales, 2013), los huevos se desintegran rápidamente, pero pueden encontrarse en heces fecales. El diagnóstico se puede realizar identificando los huevos del cestodo mediante exámenes coprológicos (Uribarren, 2015).

4.4.1.4 Prevención y control

La mejor forma de prevenir esta enfermedad es el control de pulgas y piojos ya que son vectores y hospedadores intermediarios de *Dipylidium caninum* (Barros, 2013), para esto podemos usar productos que contienen Fipronilo, Imidacopril y Selamectina (Ramón, 2012).

4.4.2 Spirometra mansonoides

Este parásito se encuentra localizado en el intestino delgado de los felinos, cada una de las proglótides tiene un útero en forma de espiral localizado al centro, el cual expulsa huevos del parásito (Barros, 2013), en cuanto a la morfología tiene un escólex de forma bolacea, los orificios del cirro y de la vagina terminan en un seno común (Fernández, 2017).




Figura 11 Huevo de *Spirometra mansonoides*. Fuente: (Autores, 2017)

4.4.2.1 Ciclo evolutivo

El ciclo evolutivo comienza cuando los huevos eclosionan por la exposición a la luz solar directa. En el agua dulce, el coracidio ciliado emerge del huevo (Parasitologist, 2014) y es comido por el primer huésped intermediario, que es un crustáceo del género *Cyclops* donde se desarrolla la larva procercoide en su interior (Valerio, Rodriguez, & Chinchilla, 2004). Cuando un vertebrado que no sea un pez ingiere el crustáceo infectado, el procercoide migra a los músculos o al tejido conectivo y se desarrolla en la etapa plerocercoide (Tapeworm, 2017). La larva definitiva se aloja generalmente en el tejido subcutáneo, pero se la puede encontrar en otros sitios como fascias, pared abdominal, pared torácica, miembros inferiores, sistema nervioso, vías urinarias y en el escroto (Barros, 2013).

4.4.2.2 Signos y síntomas

La mayoría de veces es asintomática (Tapeworm, 2017), pero de haber síntomas o signos, se pueden ver manifestaciones subcutáneas como masas palpables que pueden estar fijas o migratorias, la mayoría son indoloras, enrojecidas y pueden presentar o no prurito, eosinofilia y leucocitosis (Village, 2015). La sintomatología depende del lugar donde estén alojadas las larvas aunque la manifestación más severa se presenta en la esparganosis cerebral la cual es acompañada por dolor de cabeza, vómito, depresión pérdida de peso, anorexia, fiebre y calambres (Valerio, Rodriguez, & Chinchilla, 2004).

4.4.2.3 Diagnóstico.

El diagnóstico puede hacerse por visualización de huevos mediante exámenes coprológicos, por medio de una biopsia, tomografía y resonancia magnética (Baquerizo, 2016).

En cuanto a los estudios serológicos una prueba de tamizaje puede ser de gran ayuda aunque puede existir una reacción cruzada con cisticercosis y paragonimiosis (Valerio, Rodriguez, & Chinchilla, 2004).

4.4.2.4 Prevención y control.


Debido a que ranas, serpientes, roedores pueden están infectados debemos evitar en todo momento que los animales ingieran este tipo de animales (American Association of Veterinary Parasitologists, 2014), en cuanto a fármacos podemos usar Febendazole (Quiroz, 1999)

4.4.3 Taenia sp.

La *Taenia* es un céstodo en forma de cinta, infestaciones por este parásito se encuentran a nivel mundial, puede parasitar muchas especies entre ellos tenemos perros, gatos, ganado y numerosos vertebrados silvestres (Junquera, 2015). En cuanto a su morfología los parásitos adultos miden hasta 60 cm de longitud su cabeza esta provista de ganchos y ventosas para fijarse en la pared intestinal de sus hospedadores y su escólex tiene una doble cadena de ganchos con cuatro ventosas (Barros, 2013).



Figura 12 Huevo de *Taenia sp.* **Fuente:** (Autores, 2017)



4.4.3.1 Ciclo evolutivo

Los huevos salen en las heces ya sea en el proglótide grávido o libres por el rompimiento de éste, los huevos son infectivos luego de ser expulsados en las heces (Gallego, 2006). Cuando son ingeridos por cerdos, ganado vacuno estos actúan como hospederos intermediarios (Higuita, 2016), cuando el huésped definitivo es infectado el embrión de la tenia invade la pared intestinal y puede alcanzar el torrente sanguíneo (Pinheiro, 2017).

4.4.3.2 Signos y síntomas

La mayoría de veces la infección por *Taenia sp.* suele ser asintomática, todo depende de la carga parasitaria (American Association of Veterinary Parasitologists, 2014), en cuanto a síntomas que se pueden encontrar son dolor abdominal, nauseas, diarrea y estreñimiento (OMS, 2017).

4.4.3.3 Diagnóstico

El diagnóstico se puede realizar al encontrar segmentos o proglótides en las heces de los animales, o por medio de exámenes coprológicos para identificación de huevos (Meza, 2002)

4.4.3.4 Prevención y control.

La teniasis es una enfermedad zoonótica (OMS, 2017). Para prevenir, contralar y eventualmente eliminar esta parasitosis debemos tener un estricto control en cuanto al estado sanitario de los cerdos y manejo de sus excretas, (Garcia, Gonzales, & Gilman, 2003).

4.4.4 Mesocestoides sp.


Estos parásitos se encuentran en el intestino de perros, gatos y otros carnívoros silvestres. Carece de róstelos y ganchos, pero está armado con ventosas de forma oval. Estos parásitos miden de 30 a 250 cm de largo y 3 mm de ancho. Los proglótides maduros tienen dos órganos genitales localizados en la cara ventral de la línea media. Los huevos son de forma ovalada y miden de 40 a 60 micras (Quiroz, 1999).



Figura 13 Huevo de *Mesocestoides sp.* **Fuente:** (Autores, 2017)

4.4.4.1 Ciclo evolutivo

Los huéspedes definitivos son caninos, felinos y mustélidos que excretan los huevos por las heces, los cuales son ingeridos por el primer huésped intermediario que es un artrópodo del genero *Oribatidae* en este se desarrolla el cisticercoides (Gonzales, Díaz, & Nuñez, 1996). Cuando el primer huésped intermediario es ingerido por un segundo huésped intermediario la larva de la segunda etapa se desarrolla en una larva infecciosa de tercera etapa llamada tetratiridio (Muñoz & Olmos, 2008). Esta forma de larva se multiplica asexualmente. Cuando el segundo huésped intermediario es comido por un carnívoro, el tetratiridio se digiere. El protoscolex se adhiere a la pared del intestino delgado y los gusanos comienzan a formar proglótides grávidos que contienen los huevos (Tapeworm, 1988).



4.4.4.2 Signos y síntomas

Las infecciones con *Mesocestoides sp.* en su forma intestinal cruza de forma asintomática y poco grave, salvo en el caso de que existan invasiones masivas (Salazar, Garcia, & Rodriguez, 2014), donde se puede presentar peritonitis parasitaria, ascitis, anorexia, depresión, convulsiones, vómito (Perez, 2016), diarrea, heces con moco y puede existir granulomas y quistes (Acha, 2018).

4.4.4.3 Diagnóstico

Debido a que las manifestaciones clínicas son inconstantes y en general poco especificas el diagnóstico se realiza a través de visualización directa de los proglótides en las heces (Quiroz, 1999), con exámenes coprológicos y serológicos (Acha, 2018).

4.4.4.4 Prevención y control.

Para el control de céstodos se recomienda establecer un tratamiento químico para la desinfección de instalaciones y farmacológico como el Praziquantel y Febendazol (Altreuther, 2009). Prevenir la ingesta de animales infectados evita que los animales se parasiten (Quiroz, 1999).

4.5 PROTOZOOS

El término *protozoo* significa "primer animal", los protozoos son estructuras unicelulares que habitan en el agua y en el suelo, existen alrededor de 20.000 especies de protozoos (Tortora, Funke, & Case, 2007), poseen vida libre, aunque algunas parasitan hospedadores, su reproducción puede ser sexual y asexual. (Martínez, 2016)

4.5.1 Cystoisospora felis

Es un parásito microscópico que infesta los intestinos de gatos, se caracterizan por formar ooquistes los cuales son de forma ovalada, doble pared delgada y lisa (Quiroz, 1999). Los ooquistes tienen una medida de 38 a 51 μm por 27 a 39 μm, cuando se encuentra en la etapa de esporulación presentan dos esporoquistes que a su vez contienen dos esporozoitos (AAVP, 2014)



Figura 14 Huevo de *Cystoisospora felis*. **Fuente:** (Penn Veterinary Medicine, 2012)

4.5.1.1 Ciclo evolutivo

Los ooquistes son expulsados en las heces de los gatos, para que estas sean infectivas se necesita un periodo de tres días en el medio ambiente, luego evoluciona a etapa esporulativa, en cada ooquiste se encuentran dos esporocistos los cuales contiene cuatro esporozoitos (Penn Veterinary Medicine, 2012).



La infección se da al ingerir ooquistes esporulados o un ratón infectado con ooquistes, la multiplicación tiene lugar en las células de la mucosa intestinal donde se enquistan y después de un periodo de seis a diez días se liberan en heces donde completan su desarrollo hasta llegar a un estado infectante (ESCCAP, 2013).

4.5.1.2 Signos y síntomas

La *Cystoisospora felis* tiene reproducción asexual y sexual las cuales producen daño de células de la mucosa intestinal en yeyuno e íleon ocasionando varios síntomas clínicos como anorexia leve o moderada, en consecuencia el animal comienza a evacuar heces de consistencia blandas a totalmente acuosas (Perez, Petteta, & al, 2009), se manifiesta también la deshidratación, pérdida de peso, vómitos, anemia y en casos severos concluye con la muerte del animal (Veterinary Medical Clinic, 2016).

4.5.1.3 Diagnóstico

Se pueden observar los ooquistes mediante exámenes coproparásitarios (Veterinary Medical Clinic, 2016). Se puede realizar otras técnicas de diagnóstico a nivel de laboratorio como biopsias, citologías y serología, pero si se decide por un método no invasivo como el coproparasitario se debe realizar muestras múltiples ya que el número de oocistos varia (Klassen, Neafie, & al, 2011).

4.5.1.4 Prevención y control.

Dado a que este tipo de parásito es de distribución mundial su erradicación es imposible, pero el riesgo de infección puede disminuir si se toman medidas sanitarias como la limpieza y desinfección diaria de las áreas donde se encuentran los animales (ESCCAP, 2013). En caso de animales que vivan en hacinamiento o contacto con otros animales se recomienda realizar un tratamiento preventivo con medicamentos (Ramires, 2011).

4.5.2 Entamoeba histolytica

Es un protozoo patógeno que se encuentra en el intestino, se presentan de dos formas, la primera es un estado invasivo vegetativo ameboide y la segunda forma es de resistencia e infectante llamada quiste (Uribarren, 2017). Los quistes son de forma esférica u oval, miden de 10 a 15 µm, se dividen por mitosis sucesivas por

lo que al alcanzar la madurez tienen cuatro núcleos (INSHT, 2015).





Figura 15 Huevo de Entamoeba histolytica. Fuente: (Uribarren, 2017)

4.5.2.1 Ciclo evolutivo

El ciclo de vida de *Entamoeba histolytica* inicia una vez que el hospedador ingiere alimentos o bebidas contaminadas, las cuales contienen quistes de este protozoario que son capaces de resistir el pH gástrico (Olivos, Saavedra, Nequiz, & Perez, 2011), Cuando el quiste es ingerido, cambia a trofozoíto al llegar a los intestinos, cuando llegan al colon, los trofozoítos se adhieren a la pared para colonizarla (Pinheiro, 2017). En algunos casos los trofozoitos invaden la mucosa intestinal, a través de la circulación sanguínea llegan a tener presencia extra intestinal en hígado, el cerebro, y los pulmones con manifestaciones patológicas (CDC, 2009).



4.5.2.2 Signos y síntomas


Muchas de las veces la amebiasis puede no presentar síntomas clínicos, mientras otros casos el hospedador desarrolla disentería o enfermedad extra intestinal (Ximenez, Moran, Ramos, & Ramiro, 2007). Además se puede encontrar abscesos hepáticos, enfermedad pleuropulmonar, peritonitis, pericarditis y abscesos cerebrales (Dhawan, 2017).

4.5.2.3 Diagnóstico

Se pueden usar pruebas de sangre, biopsias de colon, exámenes de heces, extracción de líquido cefalorraquídeo y resonancia magnética (ZSP, 2016).

4.5.2.4 Prevención y control

Las medidas de control están encaminadas en el saneamiento ambiental e individual de cada animal (Inojosa, 2000). Pombar, (2017) recomienda ponerlos en cuarentena y hacer un tratamientop farmacologico a los pacientes infectados.



5. MATERIALES Y MÉTODOS

5.1 MATERIALES Y EQUIPOS

5.1.1 Materiales de campo

5.1.1.1 Físicos

- Overol
- Botas
- Guantes de inspección
- Fundas ziploc
- Cooler
- Esferos
- Marcadores indelebles
- Hojas de campo


5.1.1.2 Biológicos

Heces de cinco especies de felinos: Panthera leo, Puma concolor, Leopardus Pardalis, Leopardus tigrinus, Leopardus wiedii.

5.1.2 Materiales de laboratorio

5.1.2.1 Físicos

- Mandil
- Guantes de inspección
- Mascarilla
- Microscopio
- Portaobjetos
- Cubreobjetos
- Vaso de precipitación de 100ml
- Vasos de plástico de 3oz
- Vasos de plástico de 1oz
- Coladores



- Pipetas
- Hojas de registro
- Esferos
- Marcadores
- Papel secante
- Paletas
- Palillos

5.1.2.2 Químicos

- Lugol
- Agua destilada
- Solución salina saturada
- Detergente
- Alcohol

5.1.3 Materiales de oficina

5.1.3.1 Físico

- Computadoras
- Cd's
- Impresora
- Memoria USB
- Cámara
- Papel bond A4

5.2 MÉTODOS


5.2.1 Ubicación y división política

Esta investigación se realizó en tres unidades de manejo de vida silvestres de la provincia del Azuay, "Bioparque Amaru", "Yurak Allpa" y "Corasari".



Figura 16 Mapa de la provincia del Azuay.

Fuente: (Mis imagenes educativas, 2012)



Provincia del Azuay

Localizada al sur del Ecuador, su superficie es de 7.701 km² y tiene una población de 506.090 habitantes distribuidos en diferentes cantones como: Cuenca, Girón, Gualaceo, Nabón, Paute, Pucará, San Fernando, Santa Isabel, Sígsig, Oña, Chordeleg, El Pan, Sevilla de Oro y Guachapala. Limita al Norte con Cañar, al Sur con Loja, al Este con Morona Santiago y Zamora Chinchipe y al Oeste con el Guayas y El Oro. En cuanto al clima se define por zonas de páramo localizadas en las altas mesetas y por clima mesotérmico húmedo y semihúmedo en el resto de la provincia. La temperatura promedio oscila entre los 12°C y 20°C. (Provincia del Azuay, 2008).

Los sitios de estudio corresponden a los Zoológicos ubicados de la siguiente manera:

Amaru


En el kilómetro 6.3 de la vía Cuenca - Azogues en el sector de Rayoloma. Coordenadas 2°53'38.4"S 78°57'24.3"W (Google Maps, 2017).

Yurak Allpa

En la vía a Turi-Tarqui en el sector de Tañiloma. Coordenadas 2°57'25.7" S 79°02'55.8"W (Google Maps, 2017).

Corasari

En Yunguilla en el kilómetro 56 de la vía Cuenca – Machala. Coordenadas 3°16'00.7" S 79°16'02.0"W (Google Maps, 2017).



5.2.2 Población en estudio

5.2.2.1 Población

Se trabajó con cinco especies de félidos silvestres: veinte y tres ejemplares de Panthera leo, seis ejemplares de Puma concolor, once ejemplares de Leopardus Pardalis, dos ejemplares de Leopardus tigrinus, dos ejemplares de Leopardus wiedii.

5.2.2.2 Muestra

Se recolectaron un total de 88 muestras de heces las mismas que fueron analizadas en el laboratorio de la Universidad de Cuenca Facultad de Ciencias Agropecuarias.

5.2.2.3 Muestreo

En cada uno de los centros de manejo de vida silvestres de la provincia del Azuay, se realizó la recolección de muestras fecales de cinco especies de felinos silvestres, las muestras fueron tomadas a poco tiempo de su excreción y directamente del suelo, esto permitió la evaluación de 44 félidos con una repetición seriada a los 15 días, la distribución de los animales esta detallada en la tabla 1.




Tabla 1. Número de felinos silvestres que participan en el estudio.


Centro de rescate	Panthera leo	Puma concolor	Leopardus Pardalis	Leopardus tigrinus	Leopardus wiedii	TOTAL
Rayoloma "AMARU"	8	4	4	2	1	19
Tarqui "YURAK ALLPA"	0	0	1	0	1	2
Sta. Isabel "Corasari"	15	2	6	0	0	23
					TOTAL	44

5.2.2.4 Criterios de inclusión

- Como criterio de inclusión se consideró que los felinos no hayan sido desparasitados por lo menos en los últimos tres meses.
- Que las muestras de heces estaban frescas y bien preservadas.

5.2.2.5 Criterios de exclusión

- Felinos desparasitados en los últimos tres meses.
- Imposible manejo de los animales.



5.2.2.6 Variables dependientes

Variable de prevalencia:

• Variable de porcentaje individual de los parásitos gastrointestinales.


Para determinar la frecuencia parasitaria de los animales en estudio se realizó dos muestreos de todos los felinos silvestres en cautiverio a nivel de la provincia del Azuay.

• Grado de infestación individual de los parásitos gastrointestinales.

Según la presencia o no y la carga parasitaria se definieron como: no parasitados, leve, moderado, grave, muy grave.

5.2.2.7 Variables independientes

- Especie de felino: Las especies que se estudiaron son: Panthera leo, Puma concolor, Leopardus tigrinus, Leopardus pardalis, Leopardus wiedii.
- Sexo del felino: Determinar si el sexo influye o tiene relación con la frecuencia de parásitos.



5.3 METODOLOGÍA

5.3.1 Examen clínico

Este examen se realizó con el fin de tener un enfoque preliminar de cada paciente, para determinar la condición general del animal y revisar anormalidades menores y sistemas que pueden estar involucrados en procesos de enfermedad y malestares. Se realizó un examen físico general, anamnesis, ficha del paciente y exámenes complementarios (León, 2014).



Figura 17 Evaluación Visual

Fuente: (Autores, 2017)



Figura 18 Evaluación Física Fuente: (Autores, 2017)

5.3.2 Métodos de Manejo

Para el trabajo en campo se realizó varios métodos de manejo, como distractores y algunos ejercicios de enriquecimiento para aislar los animales y obtener las muestras de heces más frescas.





Figura 19 Distractores para aislamiento. Fuente: (Autores, 2017)

5.3.3 Toma de muestra

Para la toma de muestras se hizo una limpieza minuciosa de las instalaciones en donde se aisló los animales, las muestras de heces se recolectaron directamente del suelo y solo se tomaron heces frescas de cada animal repitiendo este proceso de muestreo a los 15 días.



Figura 20 Limpieza de cubiles de manejo. **Fuente:** (Autores, 2017)



Figura 21 Aislamiento de Panthera leo en cubiles de manejo. **Fuente:** (Autores, 2017)

Para la toma de muestras se usó guantes de inspección, se colocaron las muestras en fundas herméticas vaciando todo el aire con el fin de evitar que los huevos eclosionaran. Luego de esto se identificó la muestra con el nombre del establecimiento, fecha, especie, nombre común y nombre científico y se los trasladó al laboratorio en un cooler con hielo seco (Aranda, Serrano, & Tantalean, 2013).




Figura 22 Toma de muestras. Fuente: (Autores, 2017)



5.3.4 Pruebas de laboratorio

Las muestras fueron recibidas en el laboratorio de la Facultad de Agropecuarias de la Universidad de Cuenca.




Figura 23 Recepción de muestras. Fuente: (Autores, 2017)

Fueron analizadas 44 muestras con una repetición a los 15 días mediante los siguientes métodos:

5.3.4.1 Método en fresco con Lugol

Procedimiento:

- 1. En un portaobjetos se colocó una gota de solución salina isotónica en un extremo y en el otro extremo se colocó una gota de Lugol.
- 2. Con la punta del aplicador se tomó una pequeña muestra de aproximadamente de 1 a 4 mg de haces, en muestras con moco y sangre se eligió esta parte para estudiar.



- **3.** Se mezcló procurando hacer una suspensión en preparación delgada y quitar de la suspensión fibras y otros fragmentos grandes.
- 4. Se colocó el cubreobjetos procurando no dejar burbujas.



Fuente: (Autores, 2017)

5. Se examinó al microscopio en forma sistemática, a seco débil (10 x) y a seco fuerte (40x). (Bowman D. , 2011).



5.3.4.2 Método de flotación con solución salina saturada


Procedimiento:

1. Sé colocó 2 a 5 gramos del contenido de la muestra en un vaso de plástico para homogenizar



Fuente: (Autores, 2017)

2. Se adicionó solución salina saturada en el vaso y con la ayuda de una paleta y se homogenizó el contenido.



3. Se trasladó el contenido disuelto a otro vaso pasándolo por un colador y hasta que se llenó hasta el borde y retiramos las burbujas.



Fuente: (Autores, 2017)

4. Se colocó un cubreobjetos y se dejó reposar por 15-30 minutos.



- **5.** Luego de los 15-30 minutos se procedió a retirar los cubreobjetos con un palillo y se colocó en un portaobjetos.
- **6.** Finalmente se procedió a observar en el microscopio con el objetivo de 10x para visualización y 40 x para identificación (Sixtos, 2013).



Fuente: (Autores, 2017)

5.3.4.3 Método de sedimentación espontánea.


Procedimiento:

1. Se colocó 2 a 5 gramos del contenido de la muestra en un vaso de plástico para homogenizar.




Fuente: (Autores, 2017)

- 2. Se adicionó agua destilada en el vaso y con una paleta procedemos a homogenizar el contenido.
- **3.** Se trasladó el contenido disuelto a otro vaso pasándolo por un colador decantando el sobrenadante.



Fuente: (Autores, 2017)

- 4. Se dejó reposar por 30 minutos y se retiró el sobrenadante
- **5.** Se observó en el microscopio con el lente de 10x para visualización y 40 x para identificación (Magaro, Uttaro, & Serra, 2000)



5.3.5 Interpretación


Para la interpretación de los exámenes coprológicos se usó una técnica cualitativa que consiste en contar todos los huevos de un campo visualizando con el lente de 10x.

Según algunos autores el diagnóstico cualitativo puede indicar si la infección es leve, moderada, grave o muy grave por lo que se basan en un sistema de cruces según la carga parasitaria.

Tabla 2. Representación cuantitativa del nivel de parasitismo.

NIVEL DE INFECCIÓN	RESULTADO	REPRESENTACION				
		DEL RESULTADO				
No parasitado	No se ve ningún huevo	Ninguno.				
Leve	1 a 3 formas por campo.	+				
Moderado	4 a 7 formas por campo	++				
Grave	8 a 10 formas por campo	+++				
Muy Grave	Mayor a 10 formas por campo.	++++				

Fuente: (Gallo, 2014)




5.3.6 Análisis estadístico

Los instrumentos de medición fueron los exámenes coprológicos: en los métodos de Lugol, flotación y sedimentación. La sistematización de información se realizó y procesó a través del Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales (SPSS®) versión 24 es un programa de análisis estadístico informático.

Los estadísticos que se determinaron, fueron:

- Determinación de las frecuencias para especie felina, sexo, edad, especie parasitaria, *Phylum* y grado de parasitosis.
- Prueba de Chi cuadrado χ^2 : para las variables cualitativas al 0,05 de significancia: presencia de parásitos gastrointestinales, *Phylum* y grado parasitario en relación a la especie sexo y edad.
- Se estructuraron tablas cruzadas para especie, sexo, edad, *Phylum*, grado de parasitosis relacionándolas entre sí.



6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

6.1 RESULTADOS

6.1.1 Prevalencia de parásitos gastrointestinales

En la **Tabla 3** se muestra los parásitos gastrointestinales con mayor prevalencia en felinos silvestres de la provincia del Azuay, los de mayor porcentaje son *Entamoeba histolytica, Toxocara leonina, Mesocestoides sp., Cystoisospora felis, Toxocara cati.* Mientras que la menor incidencia la obtuvo *Strongyloides sp., Ancylostoma tubaeforme, Trichuris sp., Taenia sp., Spirometra mansonoides y Dipylidium caninum.*

Tabla 3. Frecuencia de parásitos gastrointestinales de 44 félidos silvestres.

	Positivo	%
Entamoeba histolytica	35	79,5
Toxocara leonina	33	75,0
Mesocestoides sp.	33	75,0
Cystoisospora felis	31	70,5
Toxocara cati	23	52,3
Strongyloides sp.	8	18,2
Ancylostoma tubaeforme	6	13,6
Trichuris sp.	6	13,6
Taenia sp.	6	13,6
Spirometra mansonoides	6	13,6
Dipylidium caninum	1	2,3



En la **Tabla 4** muestra los resultados de la presencia de parásitos en las diferentes especies de felinos silvestres, se obtuvo que todas las especies de felinos fueron positivas a por lo menos un parásito gastrointestinal, pero algunas especies de parásitos fueron negativas en ciertos animales como es el caso de *Strongyloides sp.* en el *Leopardus tigrinus* y *Leopardus wiedii*, *Ancylostoma tubaeforme* y *Taenia sp.* en *Puma concolor* y *Leopardus wiedii*, *Trichuris sp.* en *Puma concolor*, en cambio un caso particular es el de *Dipylidium caninum* que solo se presentó en un animal de *Panthera leo*.

Tabla 4. Frecuencia de parásitos gastrointestinales de cinco especies félidos silvestres en cetros de manejo de vida silvestre de la Provincia de Azuay.

			Strongyloides sp.	Ancylostoma	tubaeforme	Toxocara cati		Toxocara leonina			Trichuris sp.	Dipylidium	carificular	Taenia sp.		Mesocestoides		Cystoisospora	felis	Spirometra	mansonoides		Linanioeba histolytica
	N	+	%	+	%	+	%	+	%	+	%	+	%	+	%	+	%	+	%	+	%	+	%
Panthera Leo	23	5	21,7	2	8,7	9	39,1	16	69,6	1	4,3	1	4,3	3	13	19	82,6	17	73,9	2	8,7	18	78,3
Leopardus pardalis	11	1	9,1	3	27,3	6	54,5	9	81,8	2	18,2	0	0	1	9,1	6	54,5	7	63,6	2	18,2	8	72,7
Leopardus tigrinus	2	0	0	1	50	2	100	2	100	1	50	0	0	2	100	2	100	2	100	0	0	2	100
Puma Concolor	6	2	33,3	0	0	5	83,3	5	83,3	0	0	0	0	0	0	4	66,7	3	50	1	16,7	5	83,3
Leopardus Wiedii	2	0	0	0	0	1	50	1	50	2	100	0	0	0	0	2	100	2	100	1	50	2	100
TOTAL	44	8	18,2	6	13,6	23	52,3	33	75	6	13,6	1	2,3	6	13,6	33	75	31	70,5	6	13,6	35	79,5

N: Número de animales muestreados, +: Casos positivos de parasitismo

Tabla 5. Frecuencia de presencia de parásitos gastrointestinal por grupos etarios.

		N	Positivo	%		
Edad	Juvenil	12	12	27,3		
	Adulto	32	32	72,7		
	Total	44	44	100		

N: Número total de animales muestreados

Todos los animales de la presente investigación independientemente de su edad fueron positivos para parásitos gastrointestinales. Como se puede apreciar en las **Tablas 5 y 6**, los porcentajes por especie de parásitos son bastante parecidos entre felinos juveniles con adultos, a excepción de ciertos parásitos como *Dipylidium caninum* que solo se presenta en un animal juvenil, así mismo existe una diferencia en *Ancylostoma tubaeforme, Taenia sp. y Spirometra mansonoides* que se presentaron en menor porcentaje en juveniles que en adultos y otro caso es el de *Entamoeba histolytica* que apareció mayormente en juveniles que en adultos. Mientras que, desde el punto de aparición, lo parásitos más frecuentes en felinos juveniles y adultos fueron *Entamoeba histolytica*, *Mesocestoides sp. y Toxocara leonina*.

Tabla 6. Frecuencia de especies de parásitos por grupo etario.

		Eda	ad	
	Juv	enil	Adı	ulto
	Ν	%	N	%
Entamoeba histolytica	11	92	24	75
Mesocestoides sp.	9	75	24	75
Toxocara leonina	9	75	24	75
Cystoisospora felis	9	75	22	69
Toxocara cati	7	58	16	50
Strongyloides sp.	2	17	6	19
Trichuris sp.	2	17	4	13
Ancylostoma tubaeforme	1	8	5	16
Taenia sp.	1	8	5	16
Spirometra mansonoides	1	8	5	16
Dipylidium caninum	1	8	0	0

Tabla 7. Frecuencia de presencia de parásitos gastrointestinal por género.

	_	N	Positivo	%
Sexo	Hembra	26	26	59
	Macho	18	18	41
Total		44	44	100

N: Número total de animales muestreados

La presencia de parásitos gastrointestinales no difiere en el género ya que todos los animales machos y hembras resultaron positivos a por lo menos un tipo de parásito, además en las **Tablas 7 y 8** se demuestra que existe variación en la frecuencia de parasitismo gastrointestinal, por ejemplo, *Strongyloides sp.*, *Taenia sp.*, *Mesocestoides sp.*, que dio un mayor porcentaje en hembras que en machos, en cambio en la *Spirometra mansonoides* tiene un menor porcentaje en las hembras que en los machos.

Tabla 8. Frecuencia de especies de parásitos por género de un total de 26 hembras y 18 machos.

		S	ехо	
	Н	embra	Ма	cho
	N	%	N	%
Mesocestoides sp.	22	85	11	61
Entamoeba histolytica	20	77	15	83
Toxocara leonina	19	73	14	78
Cystoisospora felis	19	73	12	67
Toxocara cati	13	50	10	56
Strongyloides sp.	7	27	1	6
Taenia sp.	5	19	1	6
Ancylostoma tubaeforme	4	15	2	11
Trichuris sp.	4	15	2	11
Spirometra mansonoides	2	8	4	22
Dipylidium caninum	1	4	0	0

En cuantos a los *Phylum* de parásitos encontrados en las pruebas coproparasitarias fueron 5 géneros del *phylum Nemátoda* (*Strongyloides sp.*, *Ancylostoma tubaeforme*, *Toxocara cati*, *Toxocara leonina*, *Trichuris sp.*), 3 géneros del *phylum Platelmintos* (*Dipylidium caninum*, *Spirometra mansonoides*, *Mesocestoides sp.* y *Taenia sp.*) y dos géneros del *phylum Protozoos* (*Cystoisospora felis y Entamoeba histolytica*.).

En la **Tabla 9** se muestra los resultados de la frecuencia que tuvieron los casos positivos a parasitosis gastrointestinal desde una clasificación por *Phylum* de parásito que se encuentra en las heces de los sujetos estudiados, con lo que se obtuvo que en mayor porcentaje los parásitos que afectan a los felinos silvestres son los del *phylum Protozoo*, seguida por *Nematodos* y en menor presencia son los *Platelmintos*.

Tabla 9. Frecuencia de presencia de parásitos gastrointestinales clasificado por Phylum.

Phylum	Pro	tozoo	Plate	Imintos	Nemá	itodos
<u>-</u>	+	%	+	%	+	%
Positivo	42	95,5	36	81,8	39	88,6
Total	44		44		44	

+: Muestras positivas

Una vez que relacionamos la presencia de parásitos en los animales de la investigación con la especie de felino silvestre, con el objetivo de encontrar cual especie félida está en mayor o menor medida infestado por los diferentes *Phylum* de parásitos. Obteniendo como se puede ver a continuación en la **Tabla 10** los datos obtenidos, que el *phylum Nematodos* se encuentra en todos los animales de las especies *Leopardus tigrinus, Leopardus wiedii* y *Puma concolor*, mientras que la menor infestación muestra *Panthera leo*.

Por otro lado, todos los felinos silvestres de la investigación correspondiente a la especie *Leopardus tigrinus* y *Leopardus wiedii* resultaron positivos a *Platelmintos* y el menos número de animales infestados fue de *Leopardus pardalis*. En el caso

del Phylum Protozoos apareció en la totalidad de los animales de todas las

especies de felinos estudiadas, excepto en Leopardus pardalis.

Tabla 10. Presencia de parásitos gastrointestinales clasificado por Phylum y por especie de felino silvestre.

	Nen	nátodos	Plate	lmintos	Prote	ozoos	
	+	%	+	%	+	%	N
Panthera Leo	19	83	21	91	23	100	23
Leopardus pardalis	10	91	7	64	9	82	11
Leopardus tigrinus	2	100	2	100	2	100	2
Puma concolor	6	100	4	67	6	100	6
Leopardus Wiedii	2	100	2	100	2	100	2
TOTAL							44

^{+:} Muestras positivas, N: Número de animales muestreados.

En la tabla 11 se muestra el resultado de la relación entre el tipo de parásito y el género de felinos, se demuestra que en las hembras el tipo de parásito que más se presenta son los protozoos en un 96%, mientras que en los felinos machos se presentan Nematodos y Protozoos ambos en un 94%.

Tabla 11. Presencia de parásitos gastrointestinales clasificado por *Phylum* y por género de felino silvestre.

		Nemáto	dos	Plate	lmintos	Proto	zoos
	N	+			+	+	
		n	%	n	%	n	%
Hembra	26	22	85	24	92	25	96
Macho	18	17	94	12	67	17	94
Total	44	39		36		42	

^{+:} Muestras positivas, N: Número de animales muestreados.

Una vez que se realizó el análisis estadístico de *Chi cuadrado* no se obtuvo diferencia significativa en la mayoría de tablas cruzadas, excepto en la tabla que relaciona el sexo del felino y el *Phylum* Platelminto, que obtuvo un valor P<0,05 que es significativo, por lo que se afirma que el sexo del felino influyó en la frecuencia de parásitos del *Phylum* Platelminto, ya que como se puede observar en la **Tabla 12** los platelmintos aparecen en mayor proporción en hembras que en machos.





Tabla 12. Prueba de *Chi-cuadrado* del sexo con relación al Phylum Platelminto.

	Valor	df	Significación asintótica (bilateral)	Significación exacta (bilateral)	Significación exacta (unilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	4,701 ^a	1	,030		
Corrección de continuidad ^b	3,135	1	,077		
Razón de verosimilitud	4,708	1	,030		
Prueba exacta de Fisher				,048	,039
Asociación lineal por lineal	4,594	1	,032		

6.1.2 Grado de parasitismo gastrointestinal.

Para determinar el grado de parasitismo gastrointestinal en los felinos silvestres se determinó la escala basada en la presencia de huevos en el campo microscópico, el cual es el siguiente: (+) Leve, (++) Moderado, (+++) Grave, (++++) Muy grave. Se obtuvo como resultado con el método de Lugol que la mayoría de grados de parasitosis se presentan en forma Leve como se puede apreciar en la **Tabla 13**, con una mayoría de casos de *Toxocara cati* 31,8 %, *Toxocara Leonina* 27,3 %, *Mesocestoides sp.* 38,6 % y *Entamoeba histolytica* 61,4 %. Existiendo casos de grado Moderado con *Entamoeba histolytica* 4,5 % y un resultado único de Muy grave con *Spirometra mansanoides* 2,3%.



En el caso del método de Flotación como se puede ver en la **Tabla 14** la mayoría de los casos fueron Leves con mayor presencia de *Toxocara leonina* 31,8%, *Mesocestoides sp.* 40,9%, *Cystoisospora felis* 31,8%. En lo que refieres a grado de parasitismo Moderado el mayor porcentaje lo tiene *Toxocara leonina* con 9,1% y en la categoría de Muy grave *Trichuris sp.* y *Mesocestoides sp.* tiene una presencia del 2,3%.

Una vez evaluados las muestras de heces por la técnica de Sedimentación se obtienen los siguientes resultados como se muestran en el **Tabla 15**, en los casos de grado Leve tuvo mayor presencia *Toxocara leonina* 52,3%, *Mesocestoides* 52,3%, *Cystoisospora felis* 34,1%. Mientras que en rango Moderado esta la especie *Mesocestoides sp.* con una presencia de 4,5%. Por ultimo existe un caso de rango Muy grave con *Mesocestoides sp.* 2,3%.

Tabla 13. Grado de parasitismo gastrointestinal mediante la técnica directa de Lugol con relación a la presencia de parásitos en el total general de felinos silvestres.

		Strongwoodes	spicials sp.	Ancidostoma	tubaeforme		Toxocara cati		Toxocara	Геоппа			Taenia sp.		Mesocestoides		Cystolsospora felis		Spirometra	mansonoides			Entamoeba	nistorytica	
	N		+		+		+		+ +		++		+		+		+		+	+	+++		+	•	++
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Positivos	44	2	4,5	2	4,5	14	31,8	12	27,3	1	2,3	2	4,5	17	38,6	7	15,9	2	4,5	1	2,3	27	61,4	2	4,5

N: Número total de animales, (+): Leve, (++): Moderado, (+++): Grave, (++++): Muy Grave

Tabla 14. Grado de parasitismo gastrointestinal mediante la técnica de Flotación de solución salina con relación a la presencia de parásitos en el total general de felinos silvestres.

		Strongwloides	sp.	Ancylostoma	aeform		Toxocara cati				Koca	leomina				Trichuris sp.		Dinylidium	<u> </u>			Mesocestoides	sp.			Cyctoleoenora	felis	Snirometra	mansonoides	Entamoeba	7
	N		+		+		+		++		+		++		+	+	+++		+		+		++	+	+++		+		+		+
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Positivo	44	4	9,1	3	6,8	10	22,7	1	2,3	14	31,8	4	9,1	1	2,3	1	2,3	1	2,3	18	40,9	3	6,8	1	2,3	14	31,8	3	6,8	4	9,1

N: Número total de animales, (+): Leve, (++): Moderado, (+++): Grave, (++++): Muy Grave

Tabla 15. Grado de parasitismo gastrointestinal mediante la técnica de Sedimentación con relación a la presencia de parásitos en el total general de felinos silvestres.

		+ Strongyloi sp. sp. 4 Ancylosto tubaeforn + Toxocara leonina + Toxocara		Trichuris sp.	l	Taenia sp.			Mesocestoides	sp.				Cystoisospora	relis			Spirometra	mansonoides			Entamoeba	histolytica										
	Ν		+		+		+		+		++		+		+		+		++	+	+++		+	-	++		+		++		+	+	+
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Positivo	44	2	4,5	2	4,5	9	20,5	23	52,3	1	2,3	3	6,8	4	9,1	23	52,3	2	4,5	1	2,3	15	34,1	1	2,3	5	11,4	1	2,3	2	4,5	1	2,3


N: Número total de animales, (+): Leve, (++): Moderado, (+++): Grave, (++++): Muy Grave

7. DISCUSION

Según los datos obtenidos, del 100% de los felinos silvestres en cautiverio de la provincia del Azuay resultaron positivos a parasitismo gastrointestinal, mientras que estudios realizados por Silva (2010) demuestra que, en Toluca, México se obtuvo un 60.71% de animales positivos a parasitismo gastrointestinal.


Esta variación de resultados podría estar influenciado por el hábitat de los animales ya que en nuestro estudio los sujetos de investigación están en unidades de manejo de vida silvestre, donde permanecen en espacios reducidos, mientras que en la investigación de Silva (2010) los felinos se encuentran en la Reserva Natural Sierra de Nanchititla, en la cual los animales permanecen en vida libre. Se ha demostrado por Yáñez & Rodríguez (2015) donde babuinos de Etiopia ingieren hojas de una planta concreta para eliminar vermes que causan la enfermedad parasitaria de esquistosomiasis, las hembras de lémures embarazadas se alimentan de un árbol de tamarindo y hojas de higuera para aumentar la producción de leche y matar parásitos. Por lo tanto en la naturaleza estos animales podrían ingerir, hojas, resinas, insectos, raíces, cascaras y minerales causando un mecanismo autorregulatorio de microorganismos gastrointestinales.

Según Aranda, Serrano & Tantalean (2013) en su estudio encontró casos positivos a *Giardia felis* en las especies animales de *Puma concolor* y *Leopardus wiedii*, lo que no coincidió con esta investigación donde los casos son negativos a *Toxoplasma gondi, Giardia felis, Echinococcus multilocularis y Cruzia tentaculata.*



Los parásitos gastrointestinales con mayor prevalencia son *Entamoeba histolytica, Toxocara leonina, Mesocestoides sp., Cystoisospora felis, Toxocara cati,* estos resultados son relativos con Martínez, Binda, Laffont, & Rodríguez (2009) quienes encuentran mayor prevalencia en Toxocara cati (28%) y *Toxocara leonina* (24,6%). Mientras que la menor proporción la obtuvieron *Strongyloides sp., Ancylostoma tubaeforme, Trichuris sp., Taenia sp., Spirometra mansanoides y Dipylidium caninum*, lo que se relaciona con Martínez, Binda, Laffont, & Rodríguez (2009) que obtuvo bajos porcentajes para *Trichuris serrata* (4,5%), *Dipylidium caninum* (4%), *Taenia taenaeiformis* (3,2%), *Spirometra mansanoides* (6%) e *Cystoisospora felis* (9%). Si comprobamos con esta investigación el porcentaje de *Cystoisospora felis* es mucho más alto que los autores citados.


Silva (2010) encontró ocho géneros parasitarios en el phylum Nemátoda (Aelurostrongylus, Ancylostoma, Capillaria, Physaloptera, Spirocerca, Toxocara, Trichuris y Uncinaria), dos géneros parasitarios en el phylum Platelminto (Spirometra y Taenia) y por último dos géneros parasitarios en el phylum Protozoo (Isospora felis y Giardia). En esta investigación se encontró cinco géneros parasitarios en el phylum Nemátoda (Strongyloides sp., Ancylostoma tubaeforme, Toxocara cati, Toxocara leonina, Trichuris sp.), cuatro géneros parasitarios del **Platelmintos** (Dipylidium caninum. phylum Spirometra mansanoides. Mesocestoides sp. y Taenia sp.) y por último dos géneros parasitarios en el phylum Protozoos (Cystoisospora felis y Entamoeba histolytica), esto quiere decir que en esta investigación se encontró un número diferente de géneros parasitarios por *phylum*.



Tantaleán & Michaud (2005) estudió 18 especies de mamíferos carnívoros, en sólo tres de la familia Felidae identificaron huevos de *Spirometra mansonoides*: *Puma concolor*, (tres positivas de cinco muestras, 60%) *Panthera onca* (uno de cinco muestras, 20%) y *Leopardus pardalis* (uno de ocho muestras, 12,5 %), mientras que en este estudio cuatro especies de felinos silvestres son positivos a *Spirometra mansonoides*: *Phantera leo* (dos positivos de 23 muestras), *Leopardus pardalis* (dos positivos de 11 muestras), *Puma concolor* (un positivo de 6 muestras) y *Leopardus wiedii* (un positivo de dos muestras).

Gallas (2011), en su estudio de *Leopardus tigrinus* encontró una prevalencia del 66,7% de parásitos en el intestino delgado de los huéspedes además encontraron roedores y lagartos en sus estómagos que probablemente fueron huéspedes intermediarios de *Mesocestoides sp.*, mientras que en esta investigación se identificaron prevalencia del 100% de Mesocestoides en *Leopardus tigrinus*.


Con respecto a los céstodos en menor frecuencia según Martínez, Binda, Laffont, & Rodriguez (2009) concuerda que la eliminación de proglótides grávidos es irregular, lo que ocasiona una baja presencia de huevos de parásitos en las heces, encontrando menores valores de frecuencia para *Spirometra mansonoides* (6%), *Dipylidium caninum* (4%) y *Taenia taenaeiformis* (3,2%). Concordando con el presente estudio en donde se obtuvo un bajo porcentaje para *Taenia taenaeiformis* (13.6%), *Spirometra mansonoides* (13.6%) y *Dipylidium caninum* (2.3%).




Los resultados de la investigación realizada en la fundación de vida silvestre de Santa Cruz, Bolivia por Beltran, Beldomenico, & Gonzales (2008) concuerdan con los obtenidos en este estudio en casos positivos a parásitos como *Cystoisospora felis, Strongyloides sp., Ancylostoma sp. y Spirometra mansonoides*, además acotan que al observarse endoparasitosis de origen doméstico y antropozoonotico ocasiona riesgos epidemiológicos en las actividades de manejo y reubicación de fauna silvestre, ya que puede alterar el ecosistema natural, recomendando que se realice estudios de felinos silvestres en vida libre para obtener datos reales.

Según Chávez (2015), Tapeworm (2017), Ximénez, Morén, Ramos, & Ramiro (2007), Salazar, Garcéa, & Rodréguez (2014), American Association of Veterinary Parasitologists (2014), Iowa State University (2005), ESCCAP (2013) y Barros (2013), manifiestan que la mayoría de parasitosis son asintomáticas, en cuanto el grado de parasitismo sea leve y que la sintomatología aparecerá si hay una carga parasitaria alta interviniendo varios factores como hábitat, alimentación y limpieza. En el grado de parasitismo de este estudio, la mayoría de resultados fueron de categoría leve, es decir que los animales poseen una pequeña presencia de parásitos en el organismo, por lo no mostraron signos clínicos de la infestación.

Ruiz, Pergazere, & Kuhn (2011) no encontró huevos de trematodes ni cestodes, probablemente debido a que estos parásitos necesitan de hospedadores intermediarios en su ciclo de vida, los cuales según Ruiz, Pergazere, & Kuhn (2011) no forman parte del ambiente donde habitan los felinos en cautiverio estudiados, sin embargo en las unidades de manejo de vida silvestre analizadas en la presente investigación si existe la presencia de dichos animales que actúan como hospedadores intermediarios, esa es una de las causas por las cuales si se encontró céstodos.




En una investigación en Costa Rica en donde se estudiaron seis especies: (Leopardus wiedii), cinco ocelotes (L. pardalis), cuatro jaguares (Panthera onca), dos leones africanos (P. leo), un puma (Puma concolor) y un león breñero (Puma yagouaroundi) sus autores Chinchilla, González, Valerio, Guitiérrez, & Apéstegui (2009) nos dicen "Estos animales estaban bastantemente libres de parásitos, debido a los tratamientos rutinarios a que se les someten." Mientras que en el presente estudio se tomó como criterio de inclusión animales que no hayan sido desparasitados en los últimos tres meses. En los centros de manejo de vida silvestre del Azuay existen planes anuales de desparasitación para los felinos silvestres, los cuales al parecer no dan los mismos resultados que en la investigación de Chinchilla, González, Valerio, Guitiérrez, & Apéstegui (2009) esto podría estar ligado a fármacos, estado sanitario nutricional e instalaciones de los animales.



8. CONCLUSIONES

- Los parásitos gastrointestinales que se identificaron con mayor frecuencia en los felinos silvestres muestreados fueron Entamoeba histolytica, Toxocara leonina, Mesocestoides sp., Cystoisospora felis y Toxocara cati.
 Mientras que Strongyloides sp., Ancylostoma Tubaeforme, Trichuris sp., Taenia sp., Spirometra mansanoides y Dipylidium caninum se encontraron en menor proporción.
- La prevalencia de parásitos gastrointestinales fue del 100% en los felinos silvestres ubicados en las unidades de manejo de vida silvestre de la provincia del Azuay.
- Las tres técnicas utilizadas en esta investigación no pueden ser comparadas entre si ya que cada una identifica diferentes *Phylum* de parásitos, pero se concluye que los resultados que mayormente se presentan son moderado, leve y casos excepcionales de muy grave respecto al grado de parasitismo.



9. RECOMENDACIONES


- Realizar un examen coprológico antes de realizar cualquier desparasitación.
- Utilizar el desparasitante adecuado, en dosis y el tiempo correcto para evitar resistencia parasitaria.
- Adecuar instalaciones que eviten el exceso de humedad, suciedad, limpieza de bebederos e implementación de pediluvios, realizar la debida eliminación de heces

10. BIBLIOGRAFÍA

- American Association of Veterinary Parasitologists . (14 de 07 de 2014).

 Recuperado el 10 de 05 de 2017, de AAVP:

 http://www.aavp.org/wiki/cestodes/pseudophyllidea/spirometra/spirometramansonoides/
- AAVP. (2014). *Isospora felis*. Recuperado el 08 de Enero de 2018, de American Association of veterinary Parasitologists: http://www.aavp.org/wiki/catprotozoa/coccidia-apicomplexan/isospora-felis/
- AAVP. (2014). *Toxocara cati.* Recuperado el 03 de Septiembre de 2016, de American Asociation of Veterinary Parasitologist: http://www.aavp.org/wiki/nematodes/ascaridida/toxocara-cati/
- Acha, P. (14 de Enero de 2018). *EcuRed*. Obtenido de Mesocestoidiasis: https://www.ecured.cu/Mesocestoidiasis
- Alfaro, M. (2011). PREVALENCIA DE Ancylostoma caninum EN Canis Iupus familiaris EN EL ÁREA URBANA Y PERIURBANA DE LA COLONIA ZACAMIL, DEL MUNICIPIO DE MEJICANOS, SAN SALVADOR. Recuperado el 08 de Enero de 2018, de Universidad de El Salvador: http://ri.ues.edu.sv/1518/1/13101280.pdf
- Altreuther. (2009). *Vetbook*. Obtenido de Mesocestoides spp: http://www.vetbook.org/wiki/dog/index.php?title=Mesocestoides_spp
- American Association of Veterinary Parasitologists. (16 de Junio de 2014). *Taeniataeniaeformis (Batsch, 1786) Wolffügel, 1911.* Recuperado el 17 de Agosto de 2016, de American Association of Veterinary Parasitologists:
 https://translate.google.com/?hl=es#auto/es/Infection%20in%20cats%20is%
 20in%20diagnosed%20by%20finding%20the%20distinctive%20segments%
 20in%20the%20feces%20or%20by%20finding%20the%20eggs%20upon%2
 0fecal%20flotation.%20The%20eggs%20of%20Taeniataeniaeformis%2




Andrango, & Morales. (Octubre de 2013). *Universidad Central del Ecuador*. Recuperado el 2016, de Identificacion de las especies de pulgad y endoparasitos gastrointestinales asociadas en caninos de tres parroquias

de la zona urbana (El Condado, San Juan y quitumbe) del D.M.Q:

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/2363/1/T-UCE-0014-51.pdf

Aranda , C., Serrano, M., & Tantalean, M. (2013). *IDENTIFICACIÓN Y FRECUENCIA DE PARÁSITOS GASTROINTESTINALES EN FÉLIDOS SILVESTRES EN CAUTIVERIO EN EL PERU.* Recuperado el 03 de Octubre de 2016, de scielo: http://www.scielo.org.pe/pdf/rivep/v24n3/a13v24n3.pdf

- Aranda. (Abril de 1998). *Naturalista*. Obtenido de Tigrillo (Leopardus wiedii): http://www.naturalista.mx/taxa/41988-Leopardus-wiedii
- Arrojo, L. (2002). Parásitos de animales silvestres en cautiverio en Lima, Perú. Recuperado el 06 de Agosto de 2016, de Facultad de Ciencias Biologicas: http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/biologia/v09_n2/pdfs/parasitos.pdf
- Ayala, Domenech, Rodriguez, & Urquiaga. (Mayo de 2012). *Scielo*. Obtenido de Parasitismo intestinal por Dipylidium caninum: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0138-65572012000200010
- Baquerizo, & Manuel. (Marzo de 2016). *Slideshare*. Obtenido de Esparganosis: https://es.slideshare.net/paulzambrano2/esparganosis
- Barros Nuñez , M. (2013). Incidencia de parásitos gastrointestinales en gatos en la ciudad de Guayaquil. Recuperado el 16 de Agosto de 2016, de http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/2454/1/BARROS%20NU%C3%91EZ%20MONICA.pdf




- Beltran, L., Beldomenico, P., & Gonzales, J. (2008). Estudio coprositarasitológico de mamíferos silvestres en cautiverio con destino a relocación en Santa Cruz, Bolivia. Recuperado el 18 de Enero de 2018, de Universidad de Caldas: http://vip.ucaldas.edu.co/vetzootec/downloads/v3n1a06.pdf
- Botero, Sánchez, & Arias. (2012). *Puma concolor*. Recuperado el 21 de Mayo de 2017, de https://www.researchgate.net/profile/Andres_Arias-Alzate/publication/292144997_Puma_concolor/links/56aa441208aeaeb4cef af71f.pdf?origin=publication_list
- Bowman, D. (2011). Parasitologia para Veterinarios. España: Elsevier, pag 467.
- Bowman, D., Barr, S., Hendrix, C., & Lindsay, D. (2003). *GASTRO-INTESTINAL PARASITES OF CATS*. Recuperado el 31 de AGOSTO de 2016, de IVIS: http://www.ivis.org/advances/parasit_bowman/ddb_gi/ivis.pdf?q=sw-412-cottontail-rabbit
- Carrada, T. (2004). *Trichuriosis: Epidemiología, diagnóstico y.* Recuperado el 08 de Enero de 2018, de Medigraphic: http://www.medigraphic.com/pdfs/pediat/sp-2004/sp046j.pdf
- Cazares, M., Juárez, A., & Mejía, C. (2014). LARVA MIGRANS; UNA ZOONOSIS

 QUE AFECTA A HUMANOS DE CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO

 DE MEXICO. Recuperado el 22 de 05 de 2017, de Congreso

 Iberoamericano de Ciencias, Tecnología, Innovación y Educación:

 www.oei.es/historico/congreso2014/memoriactei/659.pdf
- CDC. (26 de Marzo de 2009). Zona Pediatrica . Obtenido de Amebiasis Entamoeba Histolytica: http://www.zonapediatrica.com/amebiasis-entamoeba-histolytica.html




- Chávez . (Diciembre de 2015). Universidad de Guayaquil. Obtenido de Prevalencia de Dipilidiasis en perros en la ciudadela Martha de Roldós de la ciudad de Guayaquil: http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/13962/1/Tesis%20Dipilidiasis%2 0en%20perros.pdf
- Chinchilla , González, Valerio, Guitiérrez, & Apéstegui. (2009). *BRENESIA* .

 Obtenido de Salud de felinos silvestres en cautiverio- Estudio integral en el

 Centro de Rescate para la Vida Silvestre La Marina-Costa Rica:

 http://www.bvs.sa.cr/articulosexternos/art17.pdf
- Clavijo, & Ramirez. (14 de Mayo de 2007). TAXONOMÍA, DISTRIBUCIÓN Y ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS FELINOS SURAMERICANOS: REVISIÓN MONOGRÁFICA. Recuperado el 21 de Mayo de 2017, de Scielo: http://www.scielo.org.co/pdf/bccm/v13n2/v13n2a03.pdf
- Cruz. (2009). *UNAM*. Obtenido de Fauna feral, fauna nociva y zoonosis: http://www.repsa.unam.mx/documentos/Cruz-Reyes_2009_faunas_feral.pdf
- DATABIO. (2014). *Ancylostoma spp.* Recuperado el 22 de 05 de 2017, de Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo: http://www.insht.es/RiesgosBiologicos/Contenidos/Fichas%20de%20agente s%20biologicos/Fichas/Parasitos/Ancylostoma%20spp.pdf
- DATABIO. (2016). *Toxocara spp.* Recuperado el 08 de Enero de 2018, de Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo: http://www.insht.es/RiesgosBiologicos/Contenidos/Fichas%20de%20agente s%20biologicos/Fichas/Toxocara%20spp.%202016.pdf
- Dhawan, V. (22 de Mayo de 2017). *Medscape*. Obtenido de Amebiasis: https://emedicine.medscape.com/article/212029-overview
- EcuRed. (2015). *Leopardus Wiedii*. Recuperado el 21 de Mayo de 2017, de https://www.ecured.cu/Leopardus Wiedii



ESCCAP. (Septiembre de 2013). Control de Protozoos Intestinales en Perros y Gatos. Recuperado el 20 de Mayo de 2017, de Consejo Europeo para el control de las Parasitosis de los Aniamles de Compañia:

http://www.esccap.org/uploads/docs/3sbvfy71_ESCCAP_Guide_6_spanish

_version_def.pdf

Escobedo, A. (2015). *Ancylostoma y Necator*. Recuperado el 08 de Enero de 2018, de Research Gate: https://www.researchgate.net/publication/287492122_Ancylostoma_y_Necat or

Estrella, M. (2015). Strongyloides stercoralis en caninos de la comuna Limoncito de la parroquia Chongón - Guayas y el riesgo en salud pública 2014.

Recuperado el 19 de Diciembre de 2017, de Universidad de Guayaquil: http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/6945

European Scientific Counsel Companion Animales Parasites. (2006). CONTROL

DE VERMES EN PERROS Y GATOS. Recuperado el AGOSTO de 31 de

2016, de ESCCAP:


http://www.esccap.org/uploads/docs/oyoq7jsy_guia1esccapesdeffeb2010.p

df

Feline Worlds. (2014). *Ocelote*. Recuperado el 21 de Mayo de 2017, de Bio Expedition: http://www.felineworlds.com/ocelote/

Fernández, I. (2017). *Parasitologia Ficha Técnica*. Obtenido de Spirometra mansonoides:

https://www.unioviedo.es/bos/Asignaturas/Parasit/.../Spirometra%20manson oides.ppt



- Gallas. (24 de Junio de 2011). Scielo. Obtenido de Mesocestoides sp. (Eucestoda, Mesocestoididae) parasitando quatro espécies de felinos silvestres no Sul do Brasil: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-29612011000200014
- Gallego Berenguer, J. (2006). *Manual de Parasitología morfología y biología de los parásitos de interes sanitario.* Barcelona: Publicacions i Edicions; pags, 518.
- CON ÉNFASIS Gallo, MANUAL DE DIAGNOSTICO ΕN (2014).**CLINICO** VETERIANRIO. LABORATORIO Recuperado de el Septiembre de 2016, de Universidad Nacional Agraria: http://repositorio.una.edu.ni/2745/1/tnl70g172m.pdf
- Garcia, Gonzales, & Gilman. (Agosto de 2003). Diagnóstico, tratamiento y control de la cisticercosis por Taenia solium. Recuperado el 16 de Mayo de 2017, de Scielo: http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-06752003000300011
- Geographic, N. (Junio de 2010). *National Geographic*. Obtenido de León africano: http://www.nationalgeographic.es/animales/leon-africano
- Gil Recio, C. (16 de Enero de 2016). *Platelmitos, información y caracteristicas*.

 Recuperado el 10 de Agosto de 2016, de Paradais Sphynx: http://invertebrados.paradais-sphync.com/platelmintos-informacion-caracteristicas.htm
- Gonzales , Díaz, & Nuñez. (1996). *Parasitosis: Helmitiasis: Cestodiasis.*Recuperado el 01 de 02 de 2017, de http://bvs1.panaftosa.org.br/local/file/textoc/Acha_v3_mesocestoidiasis.pdf
- Google Maps. (2017). Recuperado el 21 de Junio de 2017, de Google Maps: https://www.google.com.ec/maps

Guillen, S., Vidal , V., Aguirre, M., & Rodriguez , R. (2012). *HELMINTOS*. Recuperado el 23 de AGOSTO de 2016, de SEDUMA BIODIVERSIDAD


yucatan/03Parte2/Capitulo4/02Diversidad_faunistica/01%20Invertebrados/2

http://www.seduma.yucatan.gob.mx/biodiversidad-

4Helmintos.pdf

YUCATAN:


- Higuita, L. (Abril de 2016). *Aprende en Linea*. Obtenido de Teniasis/Cisticercosis.: http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/mod/page/view.php?id=1011
- Inojosa. (2000). *Entoameba histolytica*. Recuperado el 20 de Mayo de 2017, de Control y prevencion : http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lqf/hinojosa_s_le/capitulo7 .pdf
- INSHT. (20 de Mayo de 2015). Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Obtenido de Entamoeba histolytica: http://www.insht.es/RiesgosBiologicos/Contenidos/Fichas%20de%20agente s%20biologicos/Fichas/Entamoeba%20histolytica%202016.pdf
- Iowa State University. (2005). *HOOKWORMS*. Recuperado el 28 de AGOSTO de 2016, de OIE: http://www.2ndchance.info/parasite-doghookworms.pdf
- Jubb, K. (1985). Pathology of domestic animals. Recuperado el 14 de Septiembre de 2016, de Google Books: https://books.google.com.ec/books?id=Uf3Rc_II-bAC&pg=PA581&dq=trichuris+campanula&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjVh 7iLkY_PAhWJdR4KHcZ1AosQ6AEITTAG#v=onepage&q=trichuris%20cam panula&f=false




- Junquera. (02 de Agosto de 2015). *Taenia spp.* Recuperado el 17 de Agosto de 2016, de http://parasitipedia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=146 9&Itemid=1603
- Junquera, P. (29 de Junio de 2012). Dipylidium Caninum, la tenia del perro:
 Biologia, prevención y control. Recuperado el 14 de Octubre de 2016, de
 Parasitipedia.net:
 http://parasitipedia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=145
 9&Itemid=1590
- Junquera, P. (2015). STRONGYLOIDES SPP, PARASITIC THREADWORMS OF DOGS AND CATS. BIOLOGY, PREVENTION AND CONTROL. STRONGYLOIDES STERCORALIS, STRONGYLOIDES CANIS, STRONGYLOIDES TUMEFACIENS. Recuperado el 31 de AGOSTO de 2016, de PARASITEPEDIE: http://parasitipedia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=260 0&Itemid=2882
- Junquera, P. (2015). *Toxascaris leonina, nematodo intestinal*. Recuperado el 08 de Septiembre de 2016, de Parasitepedia: http://parasitipedia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=147 4&Itemid=1605
- Klassen, M., Neafie, D., & al, e. (2011). *Cryptosporidiosis, Isosporiasis, Cyclosporiasis* & *Sarcocystosis*. Recuperado el 08 de Enero de 2018, de DEFENSE TECHNICAL INFORMATION CENTER: http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a547772.pdf
- León, U. d. (07 de 2014). Exploracion física general de perros y gatos.

 Recuperado el 2017 de Mayo de 27, de Hospital Veterinario de León:

 http://servicios.unileon.es/hospital-veterinario/files/2014/07/Examenf%C3%ADsico-general.pdf



- Linnaeus. (1758). *Metropol*. Obtenido de Leopardus pardalis: http://www.metropol.gov.co/mamiferos/especies/OrdenCarnivora/FamiliaFeli dae/Leoparduspardalis/Leopardus pardalis.pdf
- Linnaeus. (1771). Mantissa plantarum, altera. Regni animalis, appendix; pags 584.
- Magaro, Uttaro, & Serra. (2000). *Técnicas de Diagnostico Parasitologico*. Recuperado el 04 de 05 de 2017, de Universidad Nacional de Rosario : https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.google.com.ec%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dweb%26cd%3D10%26cad%3Drja%26uact%3D8%26ved%3D0ahUKEwiRoJ3_ldfTAhWor1QKHQH0CtEQFghLMAk%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.fbioyf.unr.edu.ar%252
- Martínez, A. (09 de Agosto de 2016). *Paradais Sphynx*. Obtenido de Protozoos, características, clasificación y ejemplos: https://www.paradais-sphynx.com/ciencias-naturales/protozoos-caracteristicas-ejemplos.htm
- Martinez, F., Binda, J., Laffont, G., & Rodriguez, C. (2009). *HELMINTOS MAS FRECUENTES EN FELIDOS SILVESTRES*. Recuperado el 17 de Enero de 2018, de Universidad Nacional del Nordeste: http://www.unne.edu.ar/unnevieja/investigacion/com2009/CV-050.pdf
- Martinez, L., González, M., & et al. (2011). *Diagnóstico y tratamiento de la estrongiloidosis*. Recuperado el 18 de Diciembre de 2017, de Biblioteca Virtual en Salud de Cuba: http://www.bvs.sld.cu/revistas/mil/vol40_02_11/mil07211.htm
- Meza, A. (2002). *Teniasis* . Obtenido de Teniais: http://www.medigraphic.com/pdfs/patol/pt-2002/pt022d.pdf



- Miró, G., & et al. (1995). RESPUESTA TERAPÉUTICA A TIABENDAZO/IVERMECTINA EN UN CASO DE ESTRONGILOIDOSIS CANINA. Recuperado el 04 de Enero de 2018, de Universidad Autonoma de Barcelona: https://ddd.uab.cat/pub/clivetpeqani/11307064v15n3/11307064v15n3p176.p df
- Mis imagenes educativas. (2012). Recuperado el 12 de Julio de 2017, de Mis imagenes educativas: http://misimageneseducativas.blogspot.com/2012/10/azuay-mapa-division-politica-provincia.html
- Montoya, & Restrepo. (2010). Recuperado el 09 de Julio de 2017, de Phylum Nematoda: http://medicina.udea.edu.co/parasitologia/Nematoda.html
- Muñoz, & Olmos. (2008). *Encyclopedia of life*. Obtenido de Mesocestoides lineatus: http://eol.org/pages/4969153/overview
- Naturalista. (Abril de 2007). *Naturalista*. Obtenido de Puma (puma concolor): http://www.naturalista.mx/taxa/42007-Puma-concolor
- Olivos, A., Saavedra, E., Nequiz, M., & Perez, R. (2011). *Amibiasis: mecanismos moleculatres de la patogenicidad de Entamoeba histolytica*. Recuperado el 13 de 04 de 2017, de MEDIGRAPHIC: http://www.medigraphic.com/pdfs/facmed/un-2011/un112c.pdf
- OMS. (Marzo de 2017). *Organizacion Mundial de la Salud*. Obtenido de Teniasis y cisticercosis: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs376/es/
- Paradais Sphynoc. (2014 de Marzo de 2014). *Paradais Sphynoc*. Recuperado el 20 de Mayo de 2017, de León Animal, Panthera leo: https://mamiferos.paradais-sphynx.com/felinos/leones-panteras/panthera-leo.htm

- Paradais Sphynx. (16 de Junio de 2014). *Paradais Sphynx*. Obtenido de Características de los felinos: https://mamiferos.paradais-sphynx.com/informacion/felidos-o-familia-felidae.htm
- Parasitologist, A. A. (JUnio de 2014). *American Association of Veterinary Parasitologist*. Obtenido de Spirometra mansonoides: http://www.aavp.org/wiki/cestodes/pseudophyllidea/spirometra/spirometra-mansonoides/
- Pareja, A. (03 de Mayo de 2013). Imagen pareja de leones y su cria.
- Penn Veterinary Medicine. (2012). *Isospora felis*. Recuperado el 08 de Septiembre de 2016, de Diagnosis of Veterinary Endoparasitic Infections: http://research.vet.upenn.edu/Hosts/Isosporafelis/tabid/7793/Default.aspx
- Perez , A. (Septiembre de 2016). *Hospital Veterinarioco*. Obtenido de Mesocestoides: http://hospitalveterinariotaco.es/mesocestoides/
- Perez, G., Petteta, L., & al, e. (2009). Primera Descripción del Uso del Toltrazuril para la Prevención de Brotes de Coccidiosis en Criaderos Felinos.

 Recuperado el 08 de Enero de 2018, de Veterinaria Argentina: http://www.veterinariargentina.com/revista/2009/04/719/
- Pinheiro. (02 de Diciembre de 2017). *MD. SAÚDE*. Obtenido de AMEBIASIS SÍNTOMAS, CAUSAS Y TRATAMIENTO: https://www.mdsaude.com/es/2015/10/ameba-entamoeba-histolytica-2.html
- Pinheiro, P. (Septiembre de 2017). *Md.Saude*. Obtenido de TENIASIS Y CISTICERCOSIS CICLO, SÍNTOMAS Y TRATAMIENTO: https://www.mdsaude.com/es/2017/09/teniasis-y-cisticercosis.html
- Plus, M. (2016). *Medline Plus*. Obtenido de Enfermedades parasitarias: https://medlineplus.gov/spanish/parasiticdiseases.html

- Pombar, A. (Marzo de 2017). *Universidad Católica de Santiago de Guayaquil*.

 Obtenido de PREVALENCIA DE PROTOZOARIOS
 GASTROINTESTINALES EN PERROS Y GATOS DE DOS REFUGIOS EN
 LA CIUDAD DE GUAYAQUIL:
 http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/7724/1/T-UCSG-PRE-TEC-CMV-21.pdf
- Provincia del Azuay. (12 de Octubre de 2008). *La provincia del Azuay.*Recuperado el 03 de Octubre de 2016, de http://laprovinciadelazuay-byron-byron.blogspot.com/2008/10/la-provincia-del-azuay.html
- Publishing, B. (13 de 12 de 2017). Felinos. Obtenido de https://books.google.com.ec/books?id=CQasCQAAQBAJ&printsec=frontcov er&dq=felinos&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwi17LDsuojYAhXHRSYKHavdAxEQ6AEILDAB#v=onepage&q=felinos&f=false
- Quiroz, H. (1999). Parasitología y enfermedades parasitarias de animales domésticos. Recuperado el 14 de Septiembre de 2016, de Google Books: https://books.google.com.ec/books?id=xRxkXal1Y6EC&pg=PA570&lpg=PA570&dq=trichuris+campanula&source=bl&ots=k_lRknUtlL&sig=_lEblsR3ZU9Td1IAMFv8F76dc1c&hl=es&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjWncjqkl7PAhUPBh4KHcTKBalQ6AEILjAB#v=onepage&q=trichuris%20campanula&f=false
- Ramires, G. (2011). ENFERMEDADES PROTOZOARIAS ANIMALES.

 Recuperado el 08 de Enero de 2018, de Universidad de Chile: https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14 &cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLuuCZicrYAhWHOCYKHWccCcw4ChAW CDcwAw&url=https%3A%2F%2Fwww.u-cursos.cl%2Fveterinaria%2F2011%2F1%2FFU17%2F1%2Fmaterial_docen te%2Fbajar%3Fid material%3D580794&usq=

- Ramón, G. (2012). PREVALENCIA DE HELMINTOS GASTROINTESTINALES (CÉSTODOS Y NEMÁTODOS) EN CANINOS DE LA CIUDAD DE CUENCA. Recuperado el 22 de 05 de 2017, de UNIVERSIDAD DE CUENCA:
 - http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/383/1/TESIS.pdf
- Romero. (Junio de 2009). *Researchgate*. Obtenido de Leopardus wiedii: https://www.researchgate.net/publication/263275868_Leopardus_wiedii_Sc hinz_1821
- Ruiz, M. F., Pergazere, M., & Kuhn. (2011). Relevamiento de parásitos gastrointestinales por coprología en félidos silvestres bajo condiciones de cautiverio. Recuperado el 01 de Agosto de 2016, de Univerisad Nacional de Rosario: http://www.fveter.unr.edu.ar/jornadas2011/191.RUIZ,M.%20VET-UNL.%20Relevamiento%20de....pdf
- Rus, C. (2014). Estudio de los elementos parasitarios presentes en heces de carnívoros domésticos en la ciudad de Jaen. Recuperado el 08 de Septiembre de 2016, de Universidad de Jaen: http://tauja.ujaen.es/bitstream/10953.1/563/1/TFG_RusRusMar%C3%ADaC atalina.pdf
- Salazar, Garcia, & Rodriguez. (05 de 04 de 2014). *Helmitiasis en Caninos y Felinos*. Recuperado el 01 de 02 de 2017, de CES: http://revistas.ces.edu.co/index.php/ces_salud_publica/article/view/3593
- Schreber. (1775). Researchgate. Obtenido de Leopardus tigrinus: https://www.researchgate.net/profile/Andres_Arias-Alzate/publication/292145257_Leopardus_tigrinus/links/56aa45fd08ae2df82 166d6b2/Leopardus-tigrinus.pdf?origin=publication_detail

- Sheng, Z.-H., Chang, Q., Tian, S.-Q., Lou, Y., Zheng, X., Zhao, Q., & Wang, C.-R. (2012). Characterization of Toxascaris leonina and Tococaracanis from cougar (Panthera leo) and common wolf (Canis lupus) by nuclear ribosomal DNA sequences of internal transcribed spacers. Recuperado el 08 de
 - Septiembre de 2016, de Academic Journals: http://www.academicjournals.org/article/article1380727991_Sheng%20et%2 0al.pdf
- Silva, A. (Mayo de 2010). Parasitosis gastrointestinales en felinos silvestres en Nanchititla, Mexico. Toluca, Mexico. https://www.researchgate.net/publication/303065732_Parasitosis_gastrointe stinales_en_felinos_silvestres_en_Nanchititla_Mexico
- Sixtos, C. (2013). Procedimientos y técnicas para la realización de estudios coproparasitoscópicos. *Virbac Salud Animal*, 6-7.
- Soria. (15 de Mayo de 2014). *Oncilla (Leopardus tigrinus)*. Recuperado el 21 de Mayo de 2017, de Animal extincion: http://www.animalesextincion.es/articulo.php?id_noticia=380
- Tantaleán, & Michaud. (Julio de 2005). *Scielo*. Obtenido de Huéspedes definitivos de Spirometra mansonoides (Cestoda, Diphyllobothriidae) en el Perú: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1727-99332005000100015&script=sci_arttext&tlng=pt
- Tapeworm. (1988). *Mesocestoides*. Obtenido de Diagnosis of Veterinary

 Endoparasitic Infections:

 http://research.vet.upenn.edu/Hosts/Mesocestoidesspp/tabid/7804/Default.a


 spx
- Tapeworm. (2017). *Diagnosis of Veterinary Endoparasitic*. Obtenido de Spirometra mansonoides: http://research.vet.upenn.edu/Default.aspx?TabId=7817

- Thüngen, J. (1987). *Bioecologia*. Obtenido de El puma: http://www.produccionanimal.com.ar/fauna/Fauna_Argentina_general/03-el_puma.pdf
- Tortora, Funke, & Case. (2007). *Introducción a la Microbiología.* Buenos Aires, Argentina: Medica Paramericana.
- UCE. (2015). *ESTRONGILOIDIASIS*. Recuperado el AGOSTO de 29 de 2016, de UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE: https://parasitologiauce.files.wordpress.com/2015/03/e-stercoralis.pdf
- Uribarren. (5 de Diciembre de 2016). *Universidad Naciomal Autonoma de Mexico*.


 Obtenido de Diplylidiosis o Dipilidiasis :

 http://www.facmed.unam.mx/deptos/microbiologia/parasitologia/dipylidiosis.

 html
- Uribarren, T. (04 de Diciembre de 2015). *DIPYLIDIOSIS o DIPILIDIASIS*. Recuperado el 14 de Agosto de 2016, de Universidad Autonoma de México: http://www.facmed.unam.mx/deptos/microbiologia/parasitologia/dipylidiosis. html
- Uribarren, T. (2015). Larva Migrans Visceral. Recuperado el 03 de SEPTIEMBRE de 2016, de Universidad Nacional Autonoma de Mexico: http://www.facmed.unam.mx/deptos/microbiologia/parasitologia/larva-migrans-visceral.html
- Uribarren, T. (2015). STRONGYLOIDOSIS O ESTRONGILOIDIOSIS O ESTRONGILIODIASIS. Recuperado el 31 de AGOSTO de 2016, de UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO: http://www.facmed.unam.mx/deptos/microbiologia/parasitologia/strongyloido sis.html



- Uribarren, T. (13 de Febrero de 2017). *ENTAMOEBOSIS o AMIBIASIS o AMEBIASIS*. Recuperado el 13 de 04 de 2017, de UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MEXICO: http://www.facmed.unam.mx/deptos/microbiologia/parasitologia/amibiasis.ht ml
- Valerio , I., Rodriguez, B., & Chinchilla, M. (2004). *Primer hallazgo de Spirometra Mansoni en Felis domesticus de Costa Rica.* Recuperado el 16 de Agosto de 2016, de http://www.bvs.sa.cr/articulosexternos/art9.pdf
- Veterinary Medical Clinic. (2016). *Coccidiosis, Canine and Feline*. Recuperado el 11 de Septiembre de 2016, de http://www.vetmedclinic.com/?p=264
- Village. (2015). *Nodiagnosticado*. Obtenido de Infección por Spirometra mansonoides: http://www.nodiagnosticado.es/enfermedades/Infeccion-por-Spirometra-mansonoides.htm
- Washabau, R., & Day, M. (2012). *Canine and Feline Gastroenterology*. Recuperado el 14 de Septiembre de 2016, de Google Books: https://books.google.com.ec/books?id=8iwym8Q5XQ8C&pg=PA746&dq=trichuris+campanula&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjVh7iLkY_PAhWJdR4KHcZ1AosQ6AEIVTAH#v=onepage&q=trichuris%20campanula&f=false
- World heritage Encyclopedia. (2002). *Trichuris*. Recuperado el 14 de Septiembre de 2016, de Project Gutenberg Self-Publishing Press: http://www.gutenberg.us/article/WHEBN0011581978/Trichuris
- Ximenez, C., Moran, P., Ramos, F., & Ramiro, M. (2007). Amibiasis intetsinal: estado actual del conocimento. Recuperado el 13 de 04 de 2017, de MEDIGRAPHIC: http://www.medigraphic.com/pdfs/medintmex/mim-2007/mim075g.pdf



- Yañéz, & Rodríguez . (06 de Enero de 2015). *Concienciaeco*. Obtenido de Animnales Salvajes se Curan Automedicándose: https://www.concienciaeco.com/2015/01/16/nuevo-estudio-los-animales-salvajes-se-curan-automedicandose/
- Youssefi, M., Hoseini, S., Zaheri, B., & Abouhosseini, M. (2010). First report of Ancylostoma tubaeforme in Persian Leopard (Panthera pardus saxicolor).

 Recuperado el 29 de AGOSTO de 2016, de NCBI: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3279821/

Zooquito. (2018). QuitoZoo.Obtenido deTáfico de Fauna Silvestre. Recuperado el 05 de Febrero de 2018:Http://www.quitozoo.org/index.php/23-moduloderecha/52-trafico-de-fauna-silvestre

ZSP. (12 de Agosto de 2016). *Veterinariosos*. Obtenido de Entamoeba, protozoario del intestino: https://veterinariosos.blogspot.com/2016/08/entamoeba-protozoario-del-intestino.html

11.ANEXOS

Anexo 1. Grado de parasitismo gastrointestinal con relación a la especie de felino en la prueba coproparasitaria de Lugol

		Strongyloides sp.	Ancylostoma tubaeforme.	Toxocara cati	Toxocara	leonina	Taenia sp.	Mesocestoides	Cystoisospora felis.		Spirometra mansonoides	Entamoeba	histolytica.
	N	+	+	+	+	++	+	+	+	+	++++	+	++
Panthera leo	23	1	1	5	9	1	2	11	1	0	0	15	1
Leopardus pardalis	11	0	1	2	0	0	0	3	1	1	1	5	0
Leopardus tigrinus	2	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	1	0
Puma concolor	6	1	0	4	2	0	0	3	2	1	0	4	1
Leopardus wiedii	2	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	2	0


N: Número total de animales, (+): Leve, (++): Moderado, (+++): Grave, (++++): Muy Grave

Fuente: (Autores, 2017)

Anexo 2. Grado de parasitismo gastrointestinal con relación a al género en la prueba coproparasitaria de Lugol

		Strongyloides sp.	Ancylostoma tubaeforme.	Toxocara cati	Toxocara Ieonina		Taenia sp.	Mesocestoides	Cystoisospora felis.	Spirometra	mansonoides	Entamoeba	mstorytica.
	N	+	+	+	+	++	+	+	+	+	++++	+	++
Hembra	26	2	0	10	6	1	2	12	3	1	0	15	2
Macho	18	0	2	4	6	0	0	5	4	1	1	12	0
Total	44	2	2	14	12	1	2	17	7	2	1	27	2

N: Número total de animales, (+): Leve, (++): Moderado, (+++): Grave, (++++): Muy Grave



Anexo 3. Grado de parasitismo gastrointestinal con relación grupo etario en la prueba coproparasitaria de Lugol


		Strongyloides sp.	Ancylostoma tubaeforme.	Toxocara cati	Toxocara Ieonina	Toxocara leonina		Mesocestoides	Cystoisospora felis. Spirometra		mansonoides	Entamoeba histolytica.	
	N	+	+	+	+	++	+	+	+	+	++++	+	++
Juvenil	12	1	1	5	4	1	0	3	2	0	0	9	0
Adulto	32	1	1	9	8	0	2	14	5	2	1	18	2
Total	44	2	2	14	12	1	2	17	7	2	1	27	2

N: Número total de animales, (+): Leve, (++): Moderado, (+++): Grave, (++++): Muy Grave

Fuente: (Autores, 2017)

Anexo 4. Grado de parasitismo gastrointestinal con relación al género mediante prueba coproparasitaria de Flotación

		Strongyloides sp.	Ancylostoma tubaeforme.	Toxocara cati		Toxocara	leonina	Taenia sp.		Mesocestoides	Cystoisospora	relis.		Spirometra mansonoides	Entamoeba histolytica.	Strongyloides sp.
	Total	+	+	+	++	+	++	+	++++	+	+	++	++++	+	+	+
Juvenil	12	1	0	3	0	3	2	1	0	1	6	0	0	5	0	1
Adulto	32	3	3	7	1	11	2	0	1	0	12	3	1	9	3	3
Total	44	4	3	10	1	14	4	1	1	1	18	3	1	14	3	4




Anexo 5. Pruebas de *Chi-cuadrado* en comparación de cada especie con el *Phylum* Platelmintos

	Valor	df	Significación asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado	5,651 ^a	4	0,227
de Pearson Razón de verosimilitud	6,075	4	0,194
Asociación lineal por lineal	0,637	1	0,425
N de casos válidos	44		

Anexo 6. Pruebas de *Chi-cuadrado* en comparación de cada especie con el *Phylum* Nematodos

	Valor	df	Significación asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	2,168 ^a	4	0,705
Razón de verosimilitud	3,201	4	0,525
Asociación lineal por	1,945	1	0,163
lineal N de casos válidos	44		



Anexo 7. Pruebas de *Chi-cuadrado* en comparación de cada especie felina silvestre con el *Phylum* Protozoos


	Valor	df	Significación asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	6,286 ^a	4	0,179
Razón de verosimilitud	5,841	4	0,211
Asociación lineal por lineal	0,006	1	0,937
N de casos válidos	44		

Anexo 8. Pruebas de Chi-cuadrado del sexo con relación al Phylum Protozoo.

	Valor	df	Significación asintótica (bilateral)	Significación exacta (bilateral)	Significació n exacta (unilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	,072ª	1	,789		_
Corrección de continuidad ^b	,000	1	1,000		
Razón de verosimilitud	,070	1	,791		
Prueba exacta de Fisher				1,000	,656
Asociación lineal por lineal	,070	1	,791		
N de casos válidos	44				

a. 2 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,82.

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2




Anexo 9. Pruebas de Chi-cuadrado del sexo con relación al Phylum Nematodo.

	Valor	df	Significació n asintótica (bilateral)	Significació n exacta (bilateral)	Significació n exacta (unilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	1,020 ^a	1	,312		
Corrección de continuidad ^b	,278	1	,598		
Razón de verosimilitud Prueba exacta de Fisher	1,108	1	,293	,634	,308
Asociación lineal por lineal	,997	1	,318		
N de casos válidos	44				

Anexo 10. Pruebas de *Chi-cuadrado* sexo con relación al *Phylum* Platelminto.

	Valor	df	Significación asintótica (bilateral)	Significación exacta (bilateral)	Significación exacta (unilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	4,701 ^a	1	,030		
Corrección de continuidad ^b	3,135	1	,077		
Razón de verosimilitud	4,708	1	,030		
Prueba exacta de Fisher				,048	,039
Asociación lineal por lineal	4,594	1	,032		
N de casos válidos	44				




Anexo 11. Pruebas de *Chi-cuadrado* de la edad con relación al *Phylum* Nemátodos

	Valor	df	Significación asintótica (bilateral)	Significación exacta (bilateral)	Significación exacta (unilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	,150 ^a	1	,698		
Corrección de continuidad ^b	,000	1	1,000		
Razón de verosimilitud	,159	1	,690		
Prueba exacta de Fisher				1,000	,583
Asociación lineal por lineal	,147	1	,701		
N de casos válidos	44				


Anexo 12. Pruebas de *Chi-cuadrado* de la edad con relación al *Phylum* Platelmintos.

	Valor df		Significación asintótica (bilateral)	Significación exacta (bilateral)	Significación exacta (unilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	1,076 ^a	1	,300		_
Corrección de continuidad ^b	,358	1	,550		
Razón de verosimilitud	1,220	1	,269		
Prueba exacta de Fisher				,413	,287
Asociación lineal por lineal	1,051	1	,305		
N de casos válidos	44				
		E	2017)		



Anexo 13. Pruebas de Chi-cuadrado de la edad con relación al Phylum Protozoos.

	Valor	df	Significació n asintótica (bilateral)	Significació n exacta (bilateral)	Significació n exacta (unilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	,786 ^a	1	,375		
Corrección de continuidad ^b	,005	1	,941		
Razón de verosimilitud	1,309	1	,253		
Prueba exacta de Fisher				1,000	,524
Asociación lineal por lineal	,768	1	,381		
N de casos válidos	44				



Anexo 14. Hoja de Campo

"Identific	ación y frecu	encia de parásito: manejo de							utiver	io en un	idade	es de	•			
Fecha:									Евре	de:		Côdigo				
Centro de Manejo:										Felino						
Nombre clentifico:					Nombre	propio:			Proce	edencia:						
Sexo:		Edad:			Peso:											
Allmentación: / Bo	vinos	Équid	08		Aves											
SANIDAD																
Desparasitaciones							\Box		_							
Presencia de ector Pulgas	parāsītos: Garrapatas:							Desparasit	aciones	Internas:						
EXAMEN EXTE	- PNO						_									
Pelo: Normal	INIO		Opaco						Hirauto							
Olos: Normal			+ -						Anormales							
-,			Opaco													
Estado corporal:	1 Muy Delgado	2 Delgado			3 Ideal		H		4 Sobre	D880				Obeso		
ANALISIS DE LA	BORATORIO	·					_					Grado	de Infesta	ción		
				Res	eultados di	e Lugol				No parasita do	Le	we	Moderad 0	Grave	Muy grave	
				Positivo			Neg	gativo		0 huevos		-3 W06	4-7 huevos	8-10 huevos	> 10 huevos	
1.Strongyloides spp							_							1,02100		
2.Ancylostoma tuba	eforme															
3.Toxocara cati. 4. Toxocara leonina.												_				
Trichuris spp.												_				
6. Dyplidium caninu	m.											$\overline{}$				
Taenia taenaelfor	mis.															
Mesocestoldes. Glardia duodenali																
Giardia duodenali 10. Isospora felis.	Б.											-				
11. Coccidia															-	
12. Toxoplasma gor	ndl.															
13. Glarda felis																
14. Echinococcus m	nultilocularis															
15. Spirometra man																
16.Entamoeba histo	lytica															

	Resultados de Fiotación		Grado de infestación				
			No parasitado	Leve	Moderado	Grave	Muy grave
	Positivo	Negativo	0 huevos	1-3 huevos	4-7 huevos	8-10 huevos	> 10 huevos
Strongyfoldes spp.							
2.Ancylostoma tubaeforme							
3. Toxocara cati.							
Toxocara leonina.							
5. Trichuris spp.							
Dypilidium caninum.							
7. Taenia taenaelformis.							
Mesocestoldes.							
Glardia duodenalis.							
10. Isospora felis.							
11. Coccidia							
12. Toxoplasma gondi.							
13. Glardia felis							
14. Echinococcus multilocularis							
15. Spirometra mansonoides							
16.Entamoeba histolytica							
			Grado de Infestación				
				G	rado de infesta	cion	
	Resultados de	Sedimentación	No parasitado	Leve	Moderado	Grave	Muy grave
	Resultados de	Sedimentación Negativo		I			Muy grave > 10 huevos
Strongyloides spp.			parasitado	Leve	Moderado	Grave	> 10
2.Ancylostoma tubaeforme			parasitado	Leve	Moderado	Grave	> 10
2.Ancylostoma tubaeforme 3. Toxocara catl.			parasitado	Leve	Moderado	Grave	> 10
2.Ancylostoma tubaeforme 3. Toxiccara cati. 4. Toxiccara leonina.			parasitado	Leve	Moderado	Grave	> 10
Ancylostoma tubaeforme Toxocara cat. Toxocara leonina. Trichuris spo.			parasitado	Leve	Moderado	Grave	> 10
2.Ancylostoma tubaetorme 3. Toxocara cati. 4. Toxocara leonina. 5. Trichuris spp. 6. Dyplildum carinum.			parasitado	Leve	Moderado	Grave	> 10
2.Ancylostoma tubaeforme 3. Totocara call. 4. Totocara leonina. 5. Trichuris spp. 6. Dypilidium carnium. 7. Taeria teareatformis.			parasitado	Leve	Moderado	Grave	> 10
2.Ancylosioma tubasforme 2. Torcorar catl 4. Toxocara leonina. 5. Triccuris spp. 6. Dypildium carinum. 7. Taenia taenaeformis. 8. Mesocastoides.			parasitado	Leve	Moderado	Grave	> 10
2 Ancylostoma tubaeforme 3. Totocara call. 4. Totocara leonina. 5. Trichuris spp. 6. Dyplindium carnium. 7. Taerria tearreaformis. 8. Mesocestoides. 9. Glardia duodenalis.			parasitado	Leve	Moderado	Grave	> 10
2.Ancylostoma tubasforme 3. Torocara catt 4. Torocara leonina. 5. Trinchuris app. 6. Dypinidum carinum. 7. Taenia taenasformis. 8. Mesocascioles. 9. Glarda duodenalis. 10. Tosopora felis.			parasitado	Leve	Moderado	Grave	> 10
2 Ancylostoma tubasforme 3. Totocara call. 4. Totocara leonina. 5. Trichuris spp. 6. Dyplindium carnium. 7. Taerria tearreaformis. 8. Mesocestoides. 9. Glarda duodenalis. 10. Isospora fells. 11. Coccidia			parasitado	Leve	Moderado	Grave	> 10
2.Ancylostoma tubasforme 3. Torocara catt. 4. Torocara leonina. 5. Trichnuls spp. 6. Dypliidium čarinium. 7. Taenia taenaelformis. 8. Mesocostolios. 9. Glarda duodenalis. 10. Iosoppra felis. 11. Coccidia 11. Coccidia 12. Torocplasma gondi.			parasitado	Leve	Moderado	Grave	> 10
2.Ancylostoma tubiseforme 3. Totocara catl. 4. Totocara leonina. 5. Trichuris spp. 6. Dypilidium carrinm. 7. Taeria teareafformis. 8. Mesocestolos. 9. Glardia duodenalis. 10. Isospora felis. 11. Coccida 12. Totoplasma gond. 13. Glardia Felis			parasitado	Leve	Moderado	Grave	> 10
2 Ancylostoma tubasforme 3. Totocara call. 4. Totocara call. 5. Trichuris spp. 6. Dyplindium carnium. 7. Taerria taeruesformis. 8. Mesocestoides. 9. Glardia duodenalis. 10. Isospora fells. 11. Coccidia. 12. Totoptiasma gondi. 13. Glardia fells. 14. Echinococcus multiliocularis.			parasitado	Leve	Moderado	Grave	> 10
2.Ancylostoma tubastorme 3. Torocara catt. 4. Toxocara leonina. 5. Trichuris spp. 6. Dypillidium carnium. 7. Taerdi aemaetiormis. 8. Mesocestoides. 9. Glardia duodenalis. 10. Iosopora fellis. 11. Coccida 12. Toxoplaema gondi. 13. Giardia felis 14. Echinococus multilocularis 15. Spirometra mansonoldes			parasitado	Leve	Moderado	Grave	> 10
2 Ancylostoma tubaetorme 3. Totocara call. 4. Totocara call. 5. Trichuris spp. 6. Dyplindum carnium. 7. Taeria teaneatormis. 8. Mesocestoides. 9. Glardia duodenalis. 10. Isospora felis. 11. Coccidia. 12. Totopilasma gondi. 13. Glardia felis. 14. Echinococcus mutiliocularis			parasitado	Leve	Moderado	Grave	> 10

Paola Cañar Romero Xavier Lojano Carmona